

37. (653.) *L. auriculata* Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 313\*), *L. auriculata*  $\alpha$  *evoluta* Th. Fr., Lich. scand. p. 999 (1874).

**B** Jenesien: auf Porphyry im Gerölle am Saume des Lärchenwaldes gegen das „kühle Brünnl“, eine in die Nähe dieser Art gehörige Pflanze auch auf Porphyry loser Steinmauern auf dem Wiesenwege zum „Paterwald“ (Kst. 4 III. p. 708, 709 Nr. 92).

**G** Pinzolo: auf Tonalit (Kst. 4 I. p. 320).

38. (654.) *L. Pilati* (Hepp) Kbr., Par. p. 223 (1861), *Biatora Pilati* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 261 (1857), *L. proludens* Nyl. in Flora LV. (1872) p. 359, *L. botryosa* Hepp in litt. ad Metzler (1862) b. Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. (1871) p. 1109. — Arn. Nr. 438.

**O** Stanzerthal: an der senkrechten Seite eines Felsens im Fichtenwalde gegenüber St. Anton, Pleiss am Riffler 2300 m (Arn. 4 XXV. p. 377, 376); Mittelberg: nicht häufig, vom Taschachthale bis zu den oberen Höhen, noch am Gipfel des Mittagkogel (Arn. 4 XVII. p. 536, 538); Finsterthal: an der senkrechten Seite der Felswände am Wege von Kühetai zu den Seen und im Felsgerölle zwischen den Finsterthaler Seen (Arn. 4 XIV. p. 442); Vent: am Gipfel der Kreuzspitze 3450 m, nicht häufig (Arn. 4 XIX. p. 294); Gurgl: an der senkrechten Seite eines Felsens am Wege zum Eisseer (Arn. 4 XV. p. 359).

**I** Rosskogel: hie und da an Blöcken der Gerölle ober dem Weissbache bis zur Bergschneide (Arn. 4 XVII. p. 552); Waldrast: an einem Glimmerschieferfelsen am Wege gegen Matrei (Arn. 4 VI. p. 1109 Nr. 55: XI. p. 487, Exs. Nr. 466).

**K** Kleiner Rettenstein: häufig an den niedrigen Glimmerschieferfelsen ober dem Wirtshause Pass Thurn (Arn. 4 XIV. p. 485, Exs. Nr. 555).

**D** Tauern: am Gipfel des Rottenkogel (Arn. 4 XVIII. p. 258).

**B** Sarnthal: Kaserböden auf Sandstein, östliche Kaserböden auf Sandstein und Porphyry (Kst. 4 VI. p. 199).

**F** Predazzo: auf Melaphyr am Saccinabache 1070 m, ziemlich selten, auf Melaphyr auf der Höhe des Mulatto (Arn. 4 XXIII. p. 94, 95), nicht selten an den Porphyrfelsen ober dem Colbriccone-See: Exs. Nr. 805<sup>a</sup>, auch am Gipfel des Monte Paradiso (Arn. 4 XXI. p. 104); Paneveggio: auf Porphyryblöcken an der Westseite des Cavallazzo (Arn. 4 XXIII. p. 114, Exs. Nr. 805<sup>b</sup>).

39. (655.) *L. diducens* Nyl. in Flora XLVIII. (1865) p. 148, *L. auriculata*  $\beta$  *diducens* Th. Fr., Lich. scand. p. 499 (1874).

**G** Pinzolo: Mandron auf Tonalit (Kst. 4 I. p. 334).

40. (656.) *L. brachyspora* Th. Fr., Lich. scand. p. 501 (1874).

**E** Schabs bei Brixen, auf Granit, 12. April 1892 (Sarnth. b. Kst. 6 p. 305, Hb. F.).

41. (657.) *L. promiscens* Nyl. in Flora LV. (1872) p. 358, 552, LVII. (1874) p. 313, nota, *L. inops* Th. Fr., Lich. scand. p. 501 (1874). — Arn. Nr. 439.

\*) »Steht für mich noch lange nicht fest« (Arn. in litt. 8. Juni 1896).