

66. (632.) *L. platycarpa* Ach., Lich. univ. (1810) p. 173, Kbr., Syst. (1855) p. 249, Par. p. 221 (1861); siehe Arn. in Flora LIV. (1871) p. 154, *L. contigua* β *platycarpa* Fr., Lich. eur. (1831) p. 300, *L. contigua* Nyl. in Flora LVI. (1873) p. 72. — Arn. Nr. 457.

O Stanzerthal: auf allen Silikatgesteinen, St. Christoph und St. Anton auf überflutetem Gestein (Arn. 4 XXV. p. 361, 366, 369, 373, 376, 377, 383, 385, XXIX. p. 139, 138); Mittelberg: auf Gneiss und Glimmerschiefer (Arn. 4 XVII. p. 536); Silz: auf Phyllit (Arn. 4 XXII. p. 77); Kùhetal: häufig an Steinen, Blöcken, Felsen, auch in den Bächen (Arn. 4 XIV. p. 444, 448); Umhausen: am linken Bachufer beim Wasserfalle, nicht häufig (Arn. 4 VII. p. 285); Gurgl: auf Glimmerschiefer häufig, auch an Blöcken unter dem Wasser, am unteren Ende des Ramolgletschers an Wänden, über welche das fast in jeder Sommernacht wieder gefrierende Eiswasser herabrieselt, selten an Rhododendronstümmchen gegenüber Gurgl: f. *lignicola* Arn. in Flora XLV. (1862) p. 389 (Arn. 4 XV. p. 360, 354, 361, 362, 379).

I Roskogel: vom Thale bis zu den Bergschneiden, auch auf oft untergetauchten Blöcken am Seeabfusse (Arn. 4 XVII. p. 553, 556); Innsbruck: Sonnenburger Hügel auf Phyllit (Sarnth. Hb. F.), Patscherkofel, Glungezer (Pkt. Hb. F. mit anderen Flechten); an Glimmerschiefersteinen und -blöcken von Matrei bis oberhalb der Waldrast (Arn. 4 VI. p. 1110), hie und da an Kalkglimmerschieferblöcken der Matreier-Grube (Arn. 4 XIV. p. 476); Gschnitzthal: Padasterjoch 2400 m. auf Thonschiefer (Kern. 78^a Nr. 2759, 78^b VII. p. 99); Brenner: auf Gneiss häufig vom Thale bis 2600 m, auch nicht selten an Steinen und Blöcken in den Gletscherbächen (Arn. 4 XIII. p. 241, 248).

U Zillertal: am Schwarzenstein-See auf Strahlstein, dann an einem weiter oberhalb befindlichen See (Arn. 4 XXIV. p. 258).

K Auf schieferiger Grauwacke und Thonschiefer, bis in die Alpen (Ung. 8 p. 249); Grösser Rettenstein: auf Phyllit, hie und da (Arn. 4 V. p. 531); Kleiner Rettenstein: häufig an Phyllitblöcken (Arn. 4 X. p. 99); Geisstein (Zwackh).

M Schnals: am Niederjoch (Stotter & Hfl. 1 p. 123); Meran: Kirchsteigeralpe im Sinnichthale auf *Salix retusa* (Kst. 4 VI. p. 206).

E Brixen: auf Granit gegen Mühlbach (Kst. 6 p. 305); hinterstes Afers auf Thonschiefer (Sarnth. b. Kst. 6 p. 305, Hb. F.).

P Ehrenburg: auf Thonschiefer, stellenweise (Kst. 4 VII. p. 284).

D Velbertauern, Gipfel des Rottenkogel 2760 m, Proseck auf Chlorit-schiefer (Arn. 4 XVIII. p. 272, 259, 253); Lienz: auf Glimmerschiefer am Wege zur Feldwäbelalpe (Arn. 4 XVIII. p. 249).

B Sarnthal: Möltneralpen auf Sandstein (Kst. 4 VI. p. 199), Jenesien: auf Sandstein und Porphy (Kst. 4 V. p. 335, 338, VI. p. 219); Gröden: auf Porphy bei Innerpontifes (Arn. 4 XXVIII. p. 121); Schlerengebiet, Augitporphy: auf Steinen und Blöcken häufig um Ratzes, auch noch bei 1950 m in der Schlernklamm (Arn. 4 IV. p. 615); Bozen: auf Porphy ober Signat (Kst. 4 II. p. 345); Ueberetsch: auf Sandsteinen bei St. Michael (Kst. 4 II. p. 345), an Porphyrböcken der Eislöcher, auch von Heuffer gefunden (Arn. 4 VIII. p. 298); Auer: auf Porphyrböcken in der Umgebung des Castell Feder (Kst. 2 p. 26).

F Fassa: Monzoni, auf rothbraunem Diorit (Arn. 4 XX. p. 367); Predazzo: auf Melaphyr am Saccinabache 1070 m, auf Augitporphybreccie am Satteljöchl 2200 m (Arn. 4 XXIII. p. 94, 118), auf Syenit am Fusse der Margola (Arn. 4 XX. p. 359, XXIII. p. 86), auf Porphy