

87. (703.) *L. subcongrua* Nyl. in Flora LVII. (1874) p. 11.

**E** Brixen: auf Thonschiefer am Wege vom Walderhof nach Lüssen (Sarnth. b. Kst. 6 p. 306).

88. (704.) *L. incongrua* Nyl. Lich. Scand. (1860) p. 218 und in Flora LVII. (1874) p. 11. — Arn. Nr. 470.

**O** Stanzerthal: an einer Glimmerschieferwand ober den Albon-Seen (Arn. 4 XXIX. p. 134, 140. Exs. Nr. 1624<sup>a</sup>), Glimmerschieferwand im Rendelthale 2300 m, nicht häufig (Arn. 4 XXV. p. 379, 380).

**I** Rosskogel: nicht selten an der oberen, besonders aber an der senkrechten Seite der Blöcke ober dem Weissbache (Arn. 4 XVII. p. 551. Exs. Nr. 628); Brenner: selten an Gneissblöcken nicht weit vom Wilden See (Arn. 4 XIII. p. 240).

**U** Zillertal: Grünberg am Gehänge ober den Hütten nicht häufig (Arn. 4 XXIV. p. 255).

**B** Jenesiën: auf Sandstein im Walde rechts vom Wege auf den Salten (Kst. 4 V. p. 335).

**F** Predazzo: auf Porphyrböcken am Jochübergange zwischen Val Maor und Caoria; Paneveggio: auf Porphyr sparsam ober dem Cavallazzo-See (Arn. 4 XXIII. p. 114).

89. (705.) *L. viridans* (Fw.), *L. sabuletorum* var. *viridans* Fw. in Flora XI. (1828) p. 697, *Lecidella viridans* Kbr., Syst. (1855) p. 242, Par. p. 213 (1861). Siehe Arn. in Flora LV. (1872) p. 572. — Arn. Nr. 471.

**I** An Glimmerschiefersteinen oberhalb der Waldrast (Arn. 4 VI. p. 1108 Nr. 50 var.: XI. p. 487, XXI. p. 137).

**E** Grasstein (Sarnth. Hb. F.), bei Brixen und gegen Mühlbach auf Schiefer und Granit (Sarnth. und Kst. b. Kst. 6 p. 306).

**P** Ehrenburg: auf Thonschiefer vereinzelt, auf Granit bei Kiens (Kst. 4 VII. p. 284, 287).

**B** Sarnthal: östliche Kaserböden auf Sandstein (Kst. 4 VI. p. 201); Jenesiën: auf Porphyr und Sandstein, auf letzterem mit einer *f. albida* (Kst. 4 III. p. 709, 714, V. p. 335, 339); Gröden: an grösseren Porphyrsteinen im Fichtenwalde zwischen St. Ulrich und St. Peter (Arn. 1 Nr. 1734); Bozen: auf Porphyr ober Signal (Kst. 4 II. p. 346); Ueberetsch: selten an beschatteten Porphyrfelsen der mittleren Gant unweit der Eislöcher (Hb. b. Arn. 4 VIII. p. 298, X. p. 114).

**R** Ponale bei Riva (Wagner).

90. (706.) *L. parasema* Ach., *Lichen parasemus* Ach., Prodr. (1798) p. 64, *Lecidea parasema* Ach. Meth. (1803) p. 35, non *Buellia parasema* Kbr., Syst. (1855) p. 228, Par. p. 190 (1860), *Lecidella enteroleuca*  $\alpha$  *vulgaris* Kbr., Par. p. 216 (1860), non *Lecidea enteroleuca* Ach., *L. elaeochroma*  $\beta$  *achrista* Smft., Suppl. fl. lapp. (1826) p. 150. — Arn. Nr. 472.

**L** Plansee: an Aborn und Weiden (Arn. 4 XXIX. p. 124).

**O** Stanzerthal: Almejurjoch auf *Salix retusa*, *Pettnau*, an Fichtenstränken, *Alnus incana*, *Berberis*, *Rhododendron*, *Zaunholz*, *Malfontal* auf *Rhododendron* (Arn. 4 XXV. p. 400, 393, 395, 396, 400, 401,