

„Lepra“ an Rhododendron, hauptsächlich an der Unterseite der Stämmchen: St. Christoph, Rendelthal, Pleiss, Malfonthal (Arn. 4 XXV. p. 368, 367, 399, 402, 398, 397 Nr. 29 und z, XXX. p. 380\*); Mittelberg: auf Erdboden, nur steril, spärlich am Gipfel des Mittagkogel 3150 m (Arn. 4 XVII. p. 542, 538); Finsterthal: über Moosen, hauptsächlich Grimmien auf Blöcken der Gerölle, seltener auf felsigem Boden der Gneissgerölle von Kühetai bis 2600 m hinauf (Arn. 4 XIV. p. 449, 458, Exs. Nr. 601<sup>a, b</sup>), steril an älteren Rhododendronstämmchen nahe am Boden (Arn. 4 XXII. p. 81); Gurgl: auf den umliegenden Höhen über Moosen auf Felsblöcken, auf Erde, nur steril (Arn. 4 XV. p. 374).

**I** Rosskogel: auf Erde oder Moosen, hie und da (Arn. 4 XVII. p. 559); Brenner: steril nicht selten auf steinigem Boden nicht weit vom Wilden See (Arn. 4 XIII. p. 262 Nr. 93; im Verz. XXI. nicht erwähnt).

**U** Zillerthal: Finkenberg gegen Brunnhaus auf Phyllit, steril (Arn. 4 XXIV. p. 254).

**D** Velbertauern auf Erdboden, steril. Rottenkogel auf Erde oder Moosen, steril (Arn. 4 XVIII. p. 272, 256).

? **B** Jenesien: steril über Moosen am Krumbühel (Kst. 4 III. p. 718).

**F** Predazzo: auf Melaphyrerde auf der Höhe des Mulatto, steril (Arn. 4 XXIII. p. 95); Paneveggio: auf steinigem Porphyrboden ober Giuribrutt, ebendort steril auf Grimmia-Polstern (Arn. 4 XXIII. p. 116, Hb. F.).

102. (718.) **L. nivaria** Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. (1878) p. 283. — Arn. Nr. 481.

**O** Kühetai: auf Glimmerschiefersteinen längs der Einsattlung östlich ober den Plendele-Seen (Arn. 4 XIX. p. 283); Gurgl: scheint die rauhen Bergschneiden der Hochalpen zu bevorzugen; an Glimmerschiefersteinen am Wege zum Ramoljoch, auf Glimmerschiefersteinen längs der Gipfelschneide des Festkogel (Arn. 4 XX. p. 380, XV. p. 359 Nr. 60; XIX. p. 283, XX. p. 282).

103. (719.) **L. pycnocarpa** (Kbr.), Th. Fr., Lich. scand. p. 555 (1874), Lecidella pycnocarpa Kbr., Par. p. 213 (1861) — Arn. Nr. 482.

**I** Rosskogel: selten auf Blöcken des Gerölles ober dem Weissbache (Arn. 4 XVII. p. 553).

104. (720.) **L. plebeja** Nyl. in Flora XLVIII. (1865) p. 148, **L. enalliza** Nyl. in Flora XL. (1867) p. 371, Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 563. — Arn. Nr. 968.

**L** Plansee: selten auf dem Holze dicker Aeste von *Taxus baccata* im Walde östlich vom See (Arn. 4 XXIX. p. 128).

105. (721.) **L. silvicola** Fw., Lich. Schles. (1829) Nr. 171, *Biatora smaragdina* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien Wien XIX. (1869) p. 613, *L. latens* Taylor in Mackay, Fl. hibern. II. (1836) p. 259.

\* Am letzteren Orte sind die Stellen auf p. 397, 398, 399 als „Lepra“ zu *L. neglecta* abgesondert citiert, während dort die Angabe auf p. 402: „*L. neglecta* Nyl. (lepra thalli)“ vom Rendelthale unter *L. neglecta* selbst erscheint.