

734, V. p. 342, 344, 346), *Sorbus aucuparia*, *Prunus cerasus*, *Juniperus* (Kst. 4 VI. p. 221, 222); Bozen: auf Kirschbäumen, Pappeln und *Fraxinus ornus* in der Kaiserau (Kst. 4 II. p. 346, VI. p. 210, VII. p. 302, 303; b. Kern. 78<sup>a</sup> Nr. 3128, 78<sup>b</sup> VIII. p. 92), auf *Cydonia* in Gries (Kst. 4 VII. p. 303), auf Erlen in Kühbach (Kst. 2 p. 22); Tramin, auf *Salix* (Kst. 4 V. p. 331).

**F** Predazzo: auf *Rhododendron ferrugineum* im Syenitgerölle am Fusse der Margola, auf *Juniperus communis* an der Südseite der Margola (Arn. 4 XXIII. p. 147, 145).

**G** Pinzolo: auf *Castanea* häufig, auf *Alnus*, *Betula* (Kst. 4 I. p. 327, 329, 330); Ragoli, auf *Larix* (Kst. 4 V. p. 330).

**T** Lavarone, an *Fagus* (Kst. 4 VI. p. 215).

**R** San Sebastiano bei Folgaria, an *Fagus* (Kst. 4 VI. p. 215).

b) *lenticularis* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVII. (1897) p. 381, Kbr., Syst. (1855) p. 191, *B. lenticularis*  $\alpha$  *vulgaris* Kbr., Par. p. 144 (1860), *Catillaria lenticularis*  $\alpha$  *vulgaris* Th. Fr., Lich. scand. p. 568 (1874), Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVI. (1876) p. 392, *C. chalybaea* Arn. in Flora XLI. (1858) p. 502, XLIII. (1860) p. 74, LIII. (1870) p. 226. — Arn. Nr. (501).

**B** Gröden: auf *Porphy* an der Berghalde bei Wolkenstein gegen St. Peter (Arn. 4 XXX. p. 219); Ueberetsch: ziemlich selten an Blöcken der Eislöcher, auch von Heufler dort gesammelt (Arn. 4 VIII. p. 298 Nr. 72: XVI. p. 392).

14. (739.) *B. lenticularis* (Ach.) Kbr., Par. p. 144 (1860); siehe Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 567, *Lecidea lenticularis* Ach., Syn. (1814) p. 28, *B. lenticularis* \* *erubescens* Fw. b. Kbr., Syst. (1855) p. 191, *Catillaria* (*Biatorina*) *lenticularis*  $\beta$  *erubescens* Th. Fr., Lich. scand. p. 568 (1874), *B. Heppii* Mass., Symm. lich. (1855) p. 41. — Arn. Nr. 500.

**L** Schönkahler bei Vils (Britzelm. 3 p. 119).

**O** Stanzerthal: Schnannerklamm auf Kalk 1150 m (Arn. 4 XXV. p. 389).

**I** Obernberg: an einer Kalkwand beim vorderen See (Arn. 4 XIII. p. 270); Brenner: Vennathal an einer aus krystallinischem Kalk und Gneiss zusammengesetzten Felsmasse am Bachufer links vom Wege (Arn. 4 XIV. p. 495).

**U** Kufstein: Kalkwand am Eingange des Kaiserthales (Arn. 4 I. p. 706).

**K** Kitzbühel: am Horn (Zwackh).

**E** Grasstein, auf Granit; Brixen, auf Schiefer bei Seeburg (Sarnth. Hb. F.; siehe Kst. 6 p. 306), auf Granit gegen Mühlbach (Kst. *ibid.*).

**B** Jenesien: auf *Porphy* und Sandstein (Kst. 4 III. p. 710, 714); Schlern: an Dolomitfelsen bei Salegg (Arn. 4 IV. p. 643); Bozen: bei Runkelstein auf Kalk (Strasser); Ueberetsch: bei Perdonig auf *Porphy* (Kst. 4 II. p. 346); Salurn: auf Kalk (Kst. 4 VI. p. 213).

**F** Paneveggio: an *Porphy*blöcken unweit des Waldbaches gegen Rolle: forma . . . . . (Lojka b. Arn. 4 XXIII. p. 101; b. Zwackh 1 Nr. 918).

**G** Lago di Nembia, Stenico auf Kalk (Kst. 4 V. p. 326).

**R** Ponale bei Riva: forma . . . . . (Arn. 4 IX. p. 311), auf Kalk; Marocche bei Drò, alter Weg von Arco nach Nago, Nago, Torbole,