

11. (761.) *B. stellulata* Mudd, Man. Brit. Lich. (1861) p. 216, *Lecidea stellulata* Tayl. in Mackay, Fl. hibern. II. (1836) p. 118, *L. spuria* ♂ *minutula* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 313 (1857), *B. spuria* ♂ *minutula* Kbr., Par. p. 183 (1860), *B. minutula* Arn. in Flora LV. (1872) p. 292. Siehe Zahlbr. in Ann. natrhist. Hofmus. Wien IX. (1894) p. 133.

P Ehrenburg: auf Granit bei Kiens (Kst. 4 VII. p. 287).

12. (762.) *B. tumida* (Mass.) Baglietto in Mem. Accad. sc. Torino XVII. (1858) p. 434, *Lecidea tumida* Mass., Ric. (1852) p. 68, Lich. ital. exs. Nr. 303 (1855), Sched. crit. (1856) p. 163; siehe Kbr., Par. p. 222 (1861), Arn. in Flora LIII. (1870) p. 215 und LV. (1872) p. 291. — Arn. Nr. 554.

L Grenzkamm: Kreuzeck auf Kalkhornstein 2112 m (Rehm 2 p. 93).
E ? Brixen: auf Schiefer (Sarnth. b. Kst. 6 p. 307), Brixen, gegen Mühlbach auf Schiefer (Kst. *ibid.*).

B Selten auf dem Augitporphyr-Trümmergerölle bei Seis (Arn. 4 IV. p. 613); Bozen: nicht häufig an den Felsen oberhalb Gries (Arn. 4 VIII. p. 291).

13. (763.) *B. spuria* (Schaer.) Kbr., Par. p. 183 (1860); *Lecidea spuria* Schaer., Enum. (1850) p. 114 p. p.; siehe Arn. in Flora LIII. (1870) p. 215 und LV. (1872) p. 291. — Arn. Nr. 555.

M Meran: auf Glimmerschieferfelsen bei der Villa Maurer [Martinsbrunn] in Gratsch (Milde 30 p. 11).

B Bozen: an den Porphyrfelsen oberhalb Gries (Arn. 4 VIII. p. 291; XXI. p. 141; Kst. 4 V. p. 331), bei Runkelstein (Kst. 4 II. p. 347), an Porphyrböcken bei Eppan (Hfl. und Hsm. b. Kbr. 3 p. 183).

14. (764.) *B. dispersa* Mass., Lich. ital. exs. Nr. 272 (1855); siehe Arn. in Flora LIII. (1870) p. 215 und LV. (1872) p. 291. — Arn. Nr. 556.

B Bozen: nicht häufig an Porphyrböcken oberhalb Gries (Arn. 4 VIII. p. 291); Ueberetsch: „in der Gant“ (Hfl. Hb. F. mit *Lecanora subfusca* f. *lainea*).

15. (765.) *B. candidula* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. (1872) p. 291 und XXIII. (1873) p. 112. — Arn. Nr. 557.

B Bozen: nicht häufig an Porphyrböcken oberhalb Gries (Arn. 4 VIII. p. 291, X. p. 112).

16. (766.) *B. contermina* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXV. (1875) p. 444, *Lecidea contermina* Nyl. in Flora LXI. (1878) p. 249 und LXV. (1882) p. 457. — Arn. Nr. 558.

O Arlberg: Gipfel des Wirth auf Glimmerschiefer 2330 m, selten (Arn. 4 XXV. p. 383, 384); hie und da an Felsblöcken zwischen Kübetai und den Finsterthaler Seen (Arn. 4 XIV. p. 444); Vent: nicht selten am Gipfel der Kreuzspitze 3450 m (Arn. 4 XIX. p. 295); Gurgl: an Glimmerschieferblöcken im gegenüberliegenden Gerölle (Arn. 4 XIX. p. 288, XX. p. 383, Exs. Nr. 761), an Gneissfelsen am Wege zum Eissee (Arn. 4 XV. p. 360).

I Brenner: mit *Lecidea Mosigii* auf weissen Quarzblöcken seitwärts der Alpe im Venna am Wege zum Wilden See (Arn. 4 XVII. p. 568).