

P Ehrenburg: auf Thonschiefer der Steinmauer am Marbacher Sattel (Kst. 4 VII. p. 280, 285).

F Predazzo: selten auf Uralitporphyr und Turmalingranit am Mulatto (Arn. 4 XX. p. 355).

9. (790.) *Catocarpus* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. (1878) p. 275, 288. — Arn. Nr. 583.

O Gurgl: ziemlich selten an Blöcken im gegenüberliegenden Gerölle (Arn. 4 XIX. p. 288 Nr. 27).

P Taufers: nicht häufig an der senkrechten Seite eines grossen Granitblockes seitwärts im Walde unterhalb Rain (Arn. 4 XIX. p. 275 Nr. 31).

10. (791.) *C. alpicola* (? Wahlenb., Kbr.) Arn. in Flora LIV. (1871) p. 148 und Verh. zool. bot. Ges. Wien XLIII. (1893) p. 384, ?*Lecidea atrovirens* var. *alpicola* Wahlenb., Fl. lapp. (1812) p. 474, *Rhizocarpon geographicum* ♂ *alpicolum* Kbr., Syst. (1855) p. 263, Par. p. 234 (1861), *Buellia alpicola* Anzi, Catal. Lich. sondr. (1860) p. 90, Th. Fr. in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. VII. Nr. 2 (1867) p. 45, *Lecidea alpicola* Nyl., Lich. Scand. (1861) p. 247, *Rhizocarpon chionophilum* Th. Fr., Lich. scand. p. 612 (1874). — Arn. Nr. 584.

O Arlberg: auf Glimmerschiefer am Nordabhänge und am Gipfel des Wirth, an einer Glimmerwand im Rendelthale 2300 m (Arn. 4 XXIX. p. 140, XXV. p. 382, 383, 384, 379); Mittelberg: auf Gneiss und Glimmerschiefer (Arn. 4 XVII. p. 537); Finsterthal: nicht selten an Blöcken und Felsen von Kühetai bis zu den Seen, auf Steinen und Blöcken in den Bächen (Arn. 4 XIV. p. 445, 448); Gurgl: an Glimmerschieferblöcken und -felsen, Ramoljoch 3180 m, mit dürftigen Apothecien (Arn. 4 XV. p. 360, 362), Granatenschneide auf Granaten selten, gesellig mit *Rhizocarpon geographicum* (Arn. 4 XIX. p. 290).

I Rosskogel: ziemlich häufig an Felsblöcken von der Hirtenhütte aufwärts bis zum See und am Ursprunge des Weissbaches (Arn. 4 III. p. 953 Nr. 46, XVII. p. 554); Brenner: nicht selten an Steinen und Felsen von 1950 bis 2600 m, hie und da auf Blöcken in den Gletscherbächen (Arn. 4 XIII. p. 232, 243, 248).

K Kleiner Rettenstein: auf Phyllit, nicht selten an Felsen des Gipfelmassivs und an den Wänden am Wege zum Rossgrubkogel (Arn. 4 X. p. 99).

D Tauern: am Gipfel des Rottenkogel 2760 m (Arn. 4 XVIII. p. 259).

F Predazzo: im Val Sadole bei 2000—2100 m (Molendo 5. p. 581, aber nicht bei Arn. 2); Paneveggio: nicht häufig an grösseren Porphyrfelsen im Gebiete des Rollepässes (Arn. 4 XX. p. 373).

G Pinzolo: Corno alto auf Tonalit (Kst. 4 I. p. 335).

87. *Rehmia* Kph.

1. (792.) *R. caeruleoalba* Kph. in Denkschr. bot. Ges. Regensburg IV. 2 (1861) p. 211. Siehe Arn. in Flora LII. (1869) p. 262. — Arn. Nr. 573.

L Grenzkamm: auf Kalkhornstein der schwarzen Milz an der Mädelegabel 2015 m (Rehm 1 p. 115).

O Stanzerthal: Kaiserjoch 2318 m auf einem kalkarmen Gestein und mergeligem Kalk (Arn. 4 XXV. p. 369, 372); Gurgl: über krystallinischem Kalk selten auf der Hohen Mut (Arn. 4 XV. p. 366).