

Lecidea plicatilis Leight. in Ann. and Mag. Nat. Hist. 4. Ser. IV. (1869) p. 198, sec. Nyl. nach Arn. l. c.; Th. Fr. l. c. p. 631 sagt: forsam tamen confluat cum *L. plicatili*, etsi fragmenta a nobis visa hand paullum differunt). — Arn. Nr. 597.

O Kühetai: an einer feuchten Felswand am Aufstiege zur Einsattlung östlich ober den Plendele-Seen (Arn. 4 XIX. p. 284, XXI. p. 142 mit „?“).

F Predazzo: zerstreut auf den Syenitblöcken am Fusse der Margola (Arn. 4 XXIII. p. 87, Exs. Nr. 854).

17. (809.) *Rh. eupetraeum* (Nyl.) Arn., Labrador [Anhang zu Oesterr. bot. Zeitschr. XLVI. (1896)] p. 16, *Lecidea eupetraea* Nyl. in Flora LIII. (1870) p. 36. — Arn. Nr. 983.

O Paznaun: auf *Rhododendron ferrugineum* im Jamthale, selten (Arn. 4 XXVII. p. 108).

18. (810.) *Rh. subpostumum* Nyl. b. Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. (1877) p. 554. — Arn. Nr. 598.

O Stanzertal: Kaiserjoch 2318 m, auf einem kalkarmen Gestein (Arn. 4 XXV. p. 369, 371); Gurgl: auf Glimmerschiefersteinen an erdigen Stellen am Wege zur Hohen Mut (Arn. 4 XX. p. 383, Exs. Nr. 766).

I Rosskogel: selten an Steinen im Thale ober dem Weissbache am Aufstieg zur Bergschneide (Arn. 4 XVII. p. 554).

B Jenesien: Remp auf Porphyry (Kst. 4 VI. p. 219).

F Paneveggio: hie und da auf Steinen der Seiser- und Campiller-Schichten am Rollepasse (Arn. 4 XXIII. p. 124).

19. (811.) *Rh. permodestum* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIX. (1879) p. 383. — Arn. Nr. 599 [false 589].

O Gurgl: an Glimmerschieferfelsen auf der Nordseite der Hohen Mut (Arn. 4 XX. p. 383).

20. (812.) *Rhizocarpon* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIX. (1879) p. 383 und XXX. (1880) p. 99. — Arn. Nr. 600^a.

O Gurgl: an grossen Glimmerschieferblöcken der Felsgruppe ober dem Kühkomplexeck östlich ober dem Dorfe: spec. *Rh. intersito maxime affinis* (Arn. 4 XX. p. 383 Nr. 31, XXI. p. 99; b. Zwackh 1 Nr. 549).

21. (813.) *Rhizocarpon* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIX. (1879) p. 383. — Arn. Nr. 600^b.

O Gurgl: an Glimmerschiefersteinen längs der Gipfelschneide des Festkogel: *Rh. subpostumo affinis* (Arn. 4 XX. p. 383 Nr. 34).

F Paneveggio: nicht häufig an Porphyrböcken am Cavallazzo ober dem Colbriccone-See (Arn. 4 XXI. p. 105 Nr. 59).

22. (814.) *Rhizocarpon* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. (1878) p. 254. — Arn. Nr. 600^c.

D Tauern: auf Chloritschiefer bei Proseck, selten (Arn. 4 XVIII. p. 254 Nr. 40).