

B Bozen: auf *Populus nigra* in der Kaiserau (Kst. 4 VII. p. 302; h. Kern. 78^a Nr. 2763, 78^b VII. p. 100).

13. (850.) *A. lapidicola* (Taylor), Branth et Rostrup in Bot. Tidskr. III. (1869) p. 246, *Lecidea lapidicola* Taylor in Mackay, Fl. hibern. II. (1836) p. 124; *Coniangium rupestre* Kbr., Lich. sel. Germ. Nr. 110 (1857?) p. p., Par. p. 272 (1861) p. p. sec. Almq., C. *Koerberi* Lahm b. Arn. in Flora XLVI. (1863) p. 605, XLVII. (1864) p. 86. *A. vagans* var. 1 *Koerberi* Almq. in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. XVII. Nr. 6 (1879) p. 51. *A. ruderalis* Nyl. in Act. soc. Linn. Bordeaux I. (1857) p. 349. *Catillaria fusca* Mass., Ric. (1852) p. 60 sec. Nyl., *A. fusca* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 534 (1860), Kbr., Par. p. 272 (1861). — Willey l. c. p. 24 Nr. 146; Arn. Nr. 618.

O Finsterthal: selten über veralteten Lebermoosen auf felsigem Boden des Gneissgerölles zwischen Kùhetai und den Seen (Arn. 4 XIV. p. 459).

I Waldrast: selten an Kalkfelsen der Matreier Grube (Arn. 4 VI. p. 1130), ebendort ziemlich selten auf veralteten Dryasblättern (Arn. 4 VI. p. 1122, XI. p. 504).

U Vorderes Sonnwendjoch: nicht häufig an den Felsen des Gipfels (Arn. 4 XII. p. 534); Kufstein: Kaiserthal, an Kalkblöcken beim Oberkaserer (Arn. 4 I. p. 708).

K Grosser Rettenstein (Saut. 41 p. 339): auf Dolomit, nicht häufig am Abhange (Arn. 4 V. p. 540).

B Gröden: an der Mündung des Thales mit *Rhizocarpon excentricum* (Sarnth. Hb. F. det. Kst.); Schlerengebiet: an Dolomitblöcken bei der Zallinger Schwaig, an Dolomitfelsen im oberen Damers nicht weit vom Heubade, auf Tschapith unweit der Prossliner Schwaig (Arn. 4 IV. p. 647).

F An Dolomitfelsen am Ufer des Travignolo unterhalb Paneveggio (Arn. 4 XXIII. p. 133).

T Lavarone; an Kalksteinmauern (Kst. 4 VI. p. 214).

b) *parasitica* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. (1871) p. 1130, 1147, tab. XIV. fig. 1.

O Gurgl: selten auf dem Thallus einer *Peltigera* am Wege zum Eisee (Arn. 4 XV. p. 387; siehe Rehm in Rbh. Krypt.-Fl. 2. Aufl. I. Bd. 3. Abth. (1896) p. 425).

I Waldrast: auf dem Thallus der *Lecidea petrosa* auf dem Kalksteingerölle unter den Serleswänden (Arn. 4 VI. p. 1130, 1144, 1147), auch auf dem Thallus der *Bilimbia Regeliana* in der Serlesgrube (Arn. 4 XI. p. 501).

14. (851.) *A. impolita* (Ehrh.) Borrer, Engl. Bot. tab. 2692 (1833?), Kbr., Par. p. 268 (1861), Almq. in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. XVII. Nr. 6 (1879) p. 22, *Lichen impolitus* Ehrh., Pl. crypt. exs. Nr. 274 (1793), *Parmelia impolita* Ach., Meth. (1803) p. 160, Fr., Lich. eur. (1831) p. 183 excl. b., *Lepanthia impolita* Kbr., Syst. (1855) p. 295, *Patellaria pruinata* Pers. in Usteri Ann. VII. (1794) p. 28, *A. pruinosa* Ach., Lich. univ. (1810) p. 147, Nyl. in Mém. soc. sc. nat. Cherbourg IV. (1856) p. 90 und in Act. soc. Linn. Bordeaux I. (1857) p. 411, Lich. Scand. (1861) p. 258. — Willey l. c. p. 19 Nr. 109.