

— **V. amylicca** Hepp b. Kph. in Denkschr. bot. Ges. Regensburg IV. 2. (1861) p. 238. — Arn. Nr. 695.

[**P** Ampezzo: auf dem Plateau des Monte Piano 2275 m, auf Kalk (Arn. 4 XVI. p. 394), extra fines.]

22. (924.) **V. lilacina** Mass., Ric. (1852) p. 174; siehe Kbr., Par. p. 375 (1863).

R Nago: auf Kalk (Kst. 4 VII. p. 307).

23. (925.) **V. vicinalis** Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIX. (1879) p. 377. — Arn. Nr. 696.

F Paneveggio: auf Kalk an der Westseite des Monte Castellazzo: a) nicht selten längs der Kalkriffe: Exs. Nr. 772; b) von einem etwas höher gelegenen Kalkmassive daselbst in Zwackh 1 Nr. 512 niedergelegt (Arn. 4 XX. p. 377).

24. (926.) **V. myriocarpa** Hepp, Flecht. Eur. Nr. 430 (1857), Kbr., Par. p. 375 (1863), Arn. in Flora LII. (1869) p. 252. — Arn. Nr. 697.

L Auf Marmorfelsen der Rothen Wand bei Füssen (Britzelm. 3 p. 133).

O Stanzerthal: Almejurjoch auf Kalk 2224 m (Arn. 4 XXV. p. 390).

I Waldrast: an Kalkfelsen der Matreier-Grube (Arn. 4 VI. p. 1131).

U Vorderes Sonnwendjoch: nicht selten an den Felsen des Gipfels (Arn. 4 XII. p. 534).

[**P** Ampezzo: am Abhänge unter dem Griesthalgletscher, forma . . . (Arn. 4 XVI. p. 398), extra fines.]

R Ponale bei Riva (Arn. 4 IX. p. 312 Nr. 33), am alten Wege von Arco nach Nago, bei Nago, am Abhänge ober Torbole (Kst. 4 VII. p. 307); Slavini di San Marco bei Mori, nicht selten (Arn. 4 X. p. 307).

b) **pusilla** Arn. in Flora XLVII. (1864) p. 599.

U Kufstein: an Kalkblöcken beim Oberkaserer im Kaiserthale (Arn. 4 I. p. 708).

R Hie und da an den Kalkblöcken der Slavini di San Marco bei Mori (Arn. 4 IX. p. 307).

25. (927.) **V. dolosa** Hepp, Flecht. Eur. Nr. 689 (1860); siehe Arn. in Flora LXV. (1882) p. 141, LXVIII. (1885) p. 144. — Arn. Nr. 698.

I Rosskogel: an umherliegenden Steinen im Lärchenwalde bei Inzing (Arn. 4 III. p. 958).

M Meran: auf Glimmerschieferfelsen bei der Villa Maurer in Gratsch (Milde 30 p. 11, nach Bestimmung Hepp's selbst).

F Auf einem Porphyrsteine im Walde bei Paneveggio (Lojka b. Arn. 4 XXIII. p. 102).

26. (928.) **V. phaeosperma** Arn. in Flora LVII. (1874) p. 382. — Arn. Nr. 699.

In den Kalkalpen sicher weit verbreitet (Arn. 4 XIV. p. 471).

O Stanzerthal: auf Mergelkalk der Partnachschichten bei der Augsburgerhütte, sparsam (Arn. 4 XXVI. p. 103, 104).