

4. (934.) *A. caesiopsilum* (Anzi) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XIX. (1869) p. 652, *Verrucaria caesiopsila* Anzi. Lich. Longob. exs. Nr. 364 (1863) und in Comm. soc. critt. ital. II. (1864) p. 23. — Arn. Nr. 704.

**P** Ampezzo: am Gipfel des Dürrenstein 2836 m, am Abhange unter dem Griesthalgletscher, hie und da (Arn. 4 XVI. p. 400, 399).

**B** Schlern: an weissem Raiblerdolomit ober dem Heubade (Arn. 4 IV. p. 652, Exs. Nr. 366).

5. (935.) *A. dolomiticum* Mass., *Verrucaria dolomitica* Mass., Geneac. lich. (1854) p. 22. Kbr. Par. p. 362 (1863), *A. dolomiticum* Mass. Symm. lich. (1855) p. 80. — Arn. Nr. 705.

**I** Seefeld: auf Kalk bei der Asphaltfabrik (Arn. 4 II. p. 949); Waldrast: an Kalkfelsen der beiden Gruben (Arn. 4 VI. p. 1131).

**K** Grosser Rettenstein: auf Dolomit vom Abhange bis zum Gipfel (Arn. 4 V. p. 542).

**P** Ampezzo: Gipfel des Dürrenstein 2836 m, im Val Fonda nicht selten (Arn. 4 XVI. p. 400, 396).

**B** Gröden, auf Dolomit: Ladiniahütte (Arn. 4 XXX. p. 224), Geröllfeld unterhalb der Regensburgerhütte, Sellajoch am Fusse der Fünffingerspitze (Arn. 4 XXVIII. p. 115, 112); Schlerngebiet: a) an Dolomitfelsen im Walde unterhalb der Schlernklamm, b) an Dolomitblöcken unweit der Prossliner Schwaig, an Dolomitfelsen im Walde zwischen Hauenstein und der Klamm (Arn. 4 IV. p. 652); Eppan: auf Kalksteinen des Kreuzberges bei St. Pauls (Kst. 4 II. p. 348).

**T** Andalo (Kst. 4 V. p. 327 Nr. 25, in litt.); Cadine; Baselga (Pfaff).

**R** Marocche bei Dró (Kst. 4 VII. p. 307), Arco (Pfaff), Ponale, mit *Lithoidea murorum* (Arn. 4 IX. p. 312).

b) *obtectum* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XIX. (1869) p. 652.

**I** Waldrast: nicht selten an grossen Kalkblöcken unter den Serleswänden (Arn. 4 VI. p. 1131, Exs. Nr. 422).

[**P** Ampezzo: im Val Fonda und am Abhange unter dem Griesthalgletscher, nicht selten (Arn. 4 XVI. p. 396, 399), extra fines.]

**B** An Dolomitblöcken des Schlernabhanges oberhalb der Seiseralpe (Arn. 4 IV. p. 652).

**F** Paneveggio, auf Dolomit: Monte Mulaz, Cimongletscher (Arn. 4 XXIII. p. 138, 139, Hb. F.).

— *Formae* . . . . .

a) **U** Kufstein: an Kalkfelsen im Kaiserthale (Arn. 4 I. p. 706, 707, 708);

b) **K** Grosser Rettenstein: auf den Dolomit-Geröllsteinen des Gipfels (Arn. 4 V. p. 542 bei Nr. 54);

c) **I** Obernberg: an Kalkblöcken bei den Seen (Arn. 4 XIII. p. 271).

6. (936.) *A. crypticum* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1886) p. 71.

**M** Sulden: auf Kalk am End der Welt-Gletscher und bei der Payerhütte 3120 m (Arn. 4 XXII. p. 71, 72).

**F** Predazzo: Monte Cavignon, auf kleineren Dolomitsteinen eines den Felswänden vorgelagerten Gerölles (Arn. 4 XXIII. p. 130, Exs.