

b) pallidior Kst. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XL. (1890) p. 324.

G Pinzolo: auf Thonschiefer (Kst. 4 I. p. 324).

5. (1009.) *M. micula* Fw. b. Kbr., Syst. (1855) p. 373, Par. p. 397 (1865), Wainio in Meddel. soc. fauna et fl. fenn. X. (1883) p. 195; siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVI. (1896) p. 124. — Arn. Nr. 1011.

L Plansee: selten an jüngeren Weiden (Arn. 4 XXIX. p. 124).

P Ehrenburg: auf *Alnus incana*, *Prunus avium* (Kst. 4 VII. p. 297).

B Jenesien: auf *Tilia* und *Prunus avium* (Kst. 4 III. p. 731, 735) und *Fraxinus ornus* (Kst. 4 VI. p. 221); Bozen: auf entrindeten *Salix*-Stöcken ziemlich häufig in Haslach (Kst. 2 p. 31; siehe Arn. 4 XXII. p. 75).

6. (1010.) *M. analeptoides* Baglietto et Carestia in Comm. soc. critt. ital. I. (1863) p. 446, Saccardo, Syll. Fung. I. (1882) p. 715. — Arn. Nr. 761.

Charakteristisch für *Daphne mezereum* (Arn. 4 XIII. p. 275).

I Ziemlich häufig an Zweigen ober der Waldrast (Arn. 4 VI. p. 1142, Exs. Nr. 423^a; b. Rehm 6 Nr. 165) und unter ähnlichen Verhältnissen bei den Obernberger-Seen (Arn. 4 XIII. p. 275).

— *Microthelia* Kst. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLI. (1891) p. 715.

B Jenesien: auf Sandstein und Kalk (Kst. 4 III. p. 715 Nr. 49, p. 716 Nr. 14).

29. Fam. Pyrenulaceae.

120. *Tomasellia* Mass.

1. (1011.) *T. arthonioides* Mass., *Arthopyrenia arthonioides* Mass., Ric. (1852) p. 169. *T. arthonioides* Mass. in Flora XXXIX. (1856) p. 284, Kbr., Par. p. 395, *Melanthea arthonioides* Nyl. in Mém. soc. acad. Maine et Loire IV. (1858) p. 70. — Arn. Nr. 762.

Auf der Rinde von *Fraxinus ornus*.

M Meran: sehr gemein (Milde 30 p. 10; b. Kbr. 2 Nr. 266; 3 p. 395; b. Rbh. 6 Nr. 705; b. Hepp 1 Nr. 896; Eggerth b. Kern. 78^a Nr. 2357, 78^b VI. p. 122; siehe Arn. 4 XXIX. p. 133).

B Jenesien (Kst. 4 V. p. 344); bei Teis (Sarnth. b. Kst. 6 p. 309, Hb. F.); Völs, Seis, Ratzes (Milde 29 p. 20), auch bei Salegg (Arn. 4 IV. p. 628); um Bozen sehr gemein (Milde 30 p. 10), auf Laubholz (?) in Moritzing (Kst. 4 V. p. 332), bei Moritzing alles Uebrige verdrängend (Kst. 4 VI. p. 210), häufig ober Rafenstein (Kst. 4 II. p. 349), am Abhange ober Gries (Arn. 4 X. p. 111), auf glatten Rinden in den Weinbergen am Oberbozner Wege, zwischen Virgl und Campenn (Kst. 2 p. 31), bei Virgl (Milde 22 p. 53).

121. *Blastodesmia* Mass.

1. (1012.) *B. nitida* Mass., Ric. (1852) p. 180, Kbr., Par. p. 335 (1863). — Arn. Nr. 763.

Auf der Rinde von *Fraxinus ornus*.