

F Predazzo: nicht selten an den Syenitblöcken am Fusse der Margola (Arn. 4 XXIII. p. 90, Exs. Nr. 1066); Paneveggio: mit *Rhizocarpon obscuratum* an der Porphyrywand im Pellegrinothale bei 1950 m (Arn. 4 XXIII. p. 102).

127. *Sagedia* Ach.

1. (1044.) *S. declivium* Baglietto & Carestia in Comm. critt. ital. I. (1861) p. 445, *Verrucaria trechalea* Nyl. in Sällsk. fauna et fl. fenn. Förh. VIII. (1866) 1882 p. 171. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIV. (1874) p. 263. — Arn. Nr. 775.

O Finsterthal: a) nicht selten auf felsigem Boden, über veralteten Moosen und Gräsern der Felsengerölle von Kühetai bis zu den Seen, eine der charakteristischsten Flechten dieser Gerölle: Exs. Nr. 517; b) selten parasitisch auf dem veralteten Thallus der *Peltidea apthosa* bei den Seen, sehr selten am Grunde älterer *Rhododendron*-stämmchen im bezeichneten Gerölle, bei 2270 m hie und da, doch selten auf *Solorina crocea* (Arn. 4 XIV. p. 449, 459, 464, 469; 3 Nr. XVI. p. 84); Gurgl: ziemlich selten auf felsigem Boden der Hohen Mut (Arn. 4 XV. p. 375).

I Brenner: ziemlich selten auf steinigem Boden über veralteten Pflanzenresten unter einem Felsen nicht weit vom Wilden See und längs der Bergscheiden (Arn. 4 XIII. p. 263).

D Tauern: Rottenkogel, ziemlich selten über veralteten Moosen (Arn. 4 XVIII. p. 257).

2. (1045.) *S. cognata* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. (1871) p. 1123, 1147 tab. 14 fig. 7. — Arn. Nr. 776.

I Waldrast: nicht häufig auf abgedorrten Gräsern und über Moosen in der Matreier- und Serles-Grube (Arn. 4 VI. p. 1123, 1147), auch über veralteten Moosen auf dem Blaser, doch nirgends häufig (Arn. 4 XI. p. 495, 501).

3. (1046.) *S. subarticulata* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. (1871) p. 1133, 1147 tab. 14 fig. 3, 4 und Flora LIV. (1871) p. 149. — Arn. Nr. 777.

I Waldrast: an Kalksteinen des Serlesgipfels (Arn. 4 VI. p. 1116, 1133; XXI. p. 150).

F Predazzo: an Kalksteinen oben auf der Westseite des Monte Castellazzo (Arn. 4 XXIII. p. 135).

4. (1047.) *S. morbosa* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. (1871) p. 1133, 1147 tab. 14 fig. 6. — Arn. Nr. 778.

I Waldrast: selten an Kalkfelsen der Serles-Grube (Arn. 4 VI. p. 1133, 1147); Brenner: sehr selten an Gneiss-Steinen in den Gletscherbächen bei 2270 m (Arn. 4 XIII. p. 251).

5. (1048.) *S. Koerberi* Fw. in Kbr., Syst. (1855) p. 363, Par. p. 355 (1863). — Arn. Nr. 779.

O Kühetai: selten an Blöcken zwischen den Finsterthaler-Seen (Arn. 4 XIV. p. 446).

K Alpen bei Kitzbühel (Zwackh b. Kbr. 1 p. 363).

M Meran: Vöranerjoch auf Porphyry (Kst. 4 VI. p. 202).