

Handl. XVI. (1795) p. 14, *Lethagrium flaccidum* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XIV. (1864) p. 459, *Collema* (*Lathagrium*) *flaccidum* Ach., *Lich. univ.* (1810) p. 647, *Lichen rupestris* L. fil. in Swartz. *Meth. musc.* (1781) p. 37 non Scop., *Fl. carn.* ed. 2. (1772) p. 364, *Lethagrium rupestre* Mass., *Mem. lich.* (1853) p. 92. Siehe Arn. in *Flora L.* (1867) p. 135. — Arn. Nr. 793.

O Arlberg: an einer Phyllitwand im Malfonthale (Arn. 4 XXV. p. 373); Oetz: steril an einer feuchten Felsplatte im Walde gegen den Piburger-See (Arn. 4 XIV. p. 435); Umhausen: an einigen Blöcken im Walde beim Wasserfalle (Arn. 4 VII. p. 287 Nr. 1, X. p. 110); Gurgl: zwischen compacten Laubmoospolstern an einem Glimmerschieferfelsen gleich oberhalb der Ortschaft (Arn. 4 XXI. p. 97).

I Innsbruck: auf dem Schieferdache des Widums von Mutters (Pkt. b. DT. 10 p. 291; es liegt jedoch kein Exemplar vor), Sonnenburger Hügel (Sarnth. Hb. F.), an Felsen im Iglernerwalde gegen Patsch (Pkt. wie oben).

U Zillerthal: Finkenberg auf Eschen am Wege gegen Lanersbach (Arn. 4 XXIV. p. 255).

M Meran: auf Glimmerschiefer bei der Villa Maurer [Martinsbrunn] in Gratsch (Milde 30 p. 11).

E Brixen: beim Walderhofe auf Schiefer, c. ap. (Sarnth. b. Kst. 6 p. 309, Hb. F.).

P Ehrenburg: auf Thonschiefer steril hie und da, an Steinmauern an der Rienz: Simmer, vereinzelt über Moosen (Kst. 4 VII. p. 286, 288); Buchenstein oder Predazzo (Molendo b. Arn. 2 p. 459).

D Nicht häufig über bemoosten Phyllitblöcken im Tauerntale (Arn. 4 XVIII. p. 261).

B Jenesen: auf Porphyry und Sandstein, steril (Kst. 4 III. p. 712, 715, V. p. 339), an *Pirus communis* (Kst. 4 VI. p. 222); Gröden: steril auf Porphyry (Kst. 4 II. p. 350); Schlern: mit *Amphiloma triptophyllum* an Lärchen bei Ratzes (Milde 29 p. 19 und b. Arn. 4 IV. p. 629), häufig auf Augitporphyryblöcken im Walde bei Ratzes, doch gewöhnlich steril, in Spuren auf Spilit im Damers, an Fichten und am Grunde einer alten Tanne im Walde bei Ratzes, nicht häufig fruchtend, ebendort hie und da auf Kalksteinen (Arn. 4 IV. p. 616, 619, 629, 625); Bozen: an feuchten, zeitweise überronnenen Felsen ziemlich häufig: steril bei St. Georgen, Sigmundskron; Kernstock, am Kapellenbühel bei Haslach: Hausmann Hb. F., auf dem Virgl, bei Kühbach, auf Gerölle am Wege von dort zum Stallerhofe, an einem Porphyryblocke beim letzteren (Kst. 2 p. 31); zwischen Moosen im hinteren Eggenhale (Kst. 4 II. p. 350); Brantenthal bei Weissenstein, an Porphyry c. ap. (Kst. 4 VI. p. 213); Tramin, an *Salix* (Kst. 4 V. p. 332); Auer: Castell Feder auf Porphyry (Kst. 4 VI. p. 212).

F Predazzo: siehe **P**, selten c. ap. über Moosen mit *Thelidium aeneovinosum* sparsam an einer feuchten Syenitwand ober dem Travignolo am Fusse der Margola (Arn. 4 XXI. p. 101), nicht häufig auf Syenit im Fichtenwalde am Fusse der Margola (Arn. 4 XXIII. p. 91).

G Pinzolo: auf Tonalit bei S. Stefano, steril, auf Thonschiefer, steril (Kst. 4 I. p. 321, 324).

T Toblino, auf *Quercus* (Kst. 4 V. p. 330).

R Arco: an Oelbäumen, steril (Kst. 4 VII. p. 310); Monte Baldo: al Sentier di Ventrar (Poll. 1 p. 107), an Buchenstämmen all' Ortigara und anderswo in den Tridentiner Bergen (Poll. 3 III. p. 496).