Moose.

(Bryophyta.)

A. *Hepaticae* *(Lebermoose).*

I. Ordn. **Ricciales.**

1. Fam. Ricciaceae.

1. Riccia L.

1. (1.) **R. Bischoffii** Hüb. in Ann. d. Pharmac. VII. (1833) p. 68. Hepaticol. germ. (1834) p. 29, R. Bambergeri Saut. in sched. — Dum. p. 169 Nr. 10; Steph. VI. p. 315 [Sep. p. 5] Nr. 5.

M Meran (Bamb. 4 p. 664, Hb. F.), Küchelberg (Bamb. b. Saut. 30 p. 53), an sonnigen Abhängen, doch weit seltener und sparsamer als Folgende (Milde 13 p. 454), Meran (Milde b. Jack 2 p. 188): auf dem Erdreich granitischer Gesteinstrümmer, sehr häufig (Kny 1 p. 368). **B** Bozen: sehr zahlreich auf Hügeln (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 635; b. Bagl., Ces. & De Not. 1 Nr. 924), Sigmundskron (Hsm. b. Hfl. 51).

2. (2.) **R. ciliata** Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 95, R. subtumida Milde in Bot. Zeitg. XXII. 1864 p. 192, R. Bischoffii var. subtumida Milde ibid. II. Beil. p. 17. — Dum. p. 168 Nr. 6; Steph. VI. p. 319 [Sep. p. 11] Nr. 11*).

M Meran: am Küchelberg (Bamb. b. Saut. 29 p. 63; 30 p. 53), außerordentlich gemein an sonnigen Abhängen, oft große Strecken überziehend (Milde 13 p. 454), in ellenlangen, zusammenhängenden Rasen ausnehmend gemein an den dürrsten und heißesten Abhängen von Gratsch und Meran, gewöhnliche Begleiterin von Oxymitra und Grimaldia (Milde 27 p. 192 als R. subtumida = R. ciliata auct.; siehe auch 28 p. 268); das ganze Jahr hindurch an sonnigen, freien, östlichen Abhängen neben Grimaldia barbifrons die gemeinste Pflanze, weite Flächen rasenförmig überkleidend. Besonders gemein an den Abhängen des Küchelberges und an den Abhängen zwischen Gratsch

---

*) Wie uns Prof. Dr. v. Schiffner bemerkt, ist dies nach allen Standorten zu schließen, nicht die echte R. ciliata, sondern var. intumescens Bischoff in Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. II. (1835) p. 1063 tab. 71 fig. 4.