

## 9. Reboulia Raddi.

1. (16.) *R. hemisphaerica* (L.) Raddi in Opusc. sc. II. (1818) p. 357, *Marchantia hemisphaerica* L., Spec. pl. (1753) p. 1138 non Fl. suec., *Asterella hemisphaerica* Beauv., siehe Nees, Naturg. eur. Leberm. IV. (1838) p. 204, *Conocephalus quadratus* Hüb., Hepaticol. germ. (1834) p. 11 non auct. tirol. — Dum. p. 154 Nr. 1; Steph. VI. p. 791 [Sep. p. 88] Nr. 1.

**I** Innsbruck: auf der Frauhitt, Südseite unter beschatteten Felsen (Leithe 2 p. 91), Wurmbachursprung, auf Kalkfelsen (Baer b. Mat. 5 p. 90), Mauern und Innendam bei Hall, steril (Murr b. Mat. 2 p. 187).

**M** Meran: an Mauern und Felsritzen (Bamb. 4 p. 664; b. Jack 2 p. 188, Hb. F.), an Mauern hie und da, z. B. in Algund, bei Forst (Milde 13 p. 454), zwischen Gratsch und Algund (Peyr.), in Menge an einem Abhänge am Küchelberg bei der Villa Maurer [Martinsbrunn] (Milde 30 p. 9), Eingang ins Zieltal (Stolz b. Mat. 6 p. 17).

**D** Tauern: bei Kals (Funck b. Nees 2 IV. p. 206; siehe Hüb. 2 p. 11); Lienz: an feuchten Schieferfelsen (Saut. 4 p. 180).

**B** Bozen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 621): an schattigen Abhängen um Bozen (Krav. 1 p. 20), sehr häufig in den feuchten Ritzen der Porphyrfelsen am Wege zum Kühlen Brünnl (Hfl.), an Mauern unterhalb Kampenn (Hsm. Hb.); Salurn: an Kalkfelsen der Haderburg (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 24).

**T** Valsugana: an feuchten Orten beim Caldonazzo- und Levico-See, im Frühling fruchtend, häufig mit *f. minor* C. Mass. (Vent. 22 p. 1); Borgo, gegen San Giorgio, Bienno (Pfaff).

**R** Arco: an Kalkfelsen (Diettr., teste Mat.); Riva, an der Straße nach Pranzo (Pfaff b. Mat. 5 p. 90); Monte Baldo: Val delle pietre (Poll. 3 III. p. 397).

## 10. Grimaldia Raddi.

1. (17.) *G. angustifolia* (Neck.) Lindb. in Notiser Sällsk. fauna et fl. fenn. Förh. IX. (1868) p. 285, *Marchantia angustifolia* Neck., Meth. Musc. (1771) p. 117, *G. dichotoma* Raddi in Opusc. sc. II. (1835) p. 356. — Dum. p. 157 Nr. 3; Steph. VI. p. 792 [Sep. p. 89] Nr. 1.

**I** Hafelekar 2243 m (Stolz b. Jack 2 p. 188); Blaser: auf entblößtem Boden zwischen Gras bei 2100 m (Arn. 4 XI. p. 494, 496; b. Rbh. u. Gottsche 1 Nr. 517; b. Jack 2 p. 188).

**M** Meran: in kleinen Erdhöhlen am Waal bei Algund mit *Targionia* und *Gymnogramme leptophylla*, ziemlich selten (Milde 13 p. 454), nur am Grunde von senkrechten Felswänden an den heißesten Stellen sonniger, freier Abhänge zwischen Gratsch und Algund (Milde 30 p. 9), Küchelberg (Stolz b. Jack 2 p. 188).

**B** Bozen: im Viertel Sand bei Gries (Hsm. Hb.).

2. (18.) *G. fragrans* (Balbis) Corda in Nees, Naturg. eur. Leberm. IV. (1838) p. 225, *Marchantia fragrans* Balbis in Acta taurin. X. (1802) p. 73 non Schleich., Exs., Cent. III. (1806) Nr. 64 und b. DC. in Lam. et DC., Fl. franç. 3. éd. II. (1805) p. 423, *G. barbifrons* Bischoff in Nova Acta Acad. nat. eur. XVII. (1835) p. 1028. — Dum. p. 156 Nr. 1; Steph. VI. p. 795 [Sep. p. 92] Nr. 5.

**I** Innsbruck: Spitzbühel (Hfl. b. Mat. 2 p. 187), auf Sandhügeln am Spitzbühel, am linksseitigen Raine am Wege von Mühlau nach Arzl