

**M** Stilsferjoch: Franzeshöhe über 2200 m (Peyr.); Meran: an Wassermauern in Gratsch und an Mauern bei Forst an der Chaussée (Milde 13 p. 454), Masulschlucht (Pfaff b. Mat. 5 p. 90).

**P** Bei Ehrenburg, Bruneck, Olang (Simmer).

**D** Bei Aßling (Simmer); Lienz: Draufer, auf Kalkschotter und Felsen: *Preissia hemisphaerica*, an von kalksinternden Quellen überrieselten Steinen bei Amlach: *P. quadrata* Scop. (F. Saut. 4 p. 180), Tristach (Simmer).

**N** Rabbi, in Wäldern (Vent. 22 p. 2).

**B** Rittnerhorn, am Wasserl (Hsm. Hb.); Alpenwald über Plan in Gröden (Hfl.); Bozen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 624): Felsen im Eisakbette unterhalb des Calvarienberges (Zickendr. b. Warost. 9 p. 24); an feuchten Abhängen der Gebirge um Bozen (Krav. 1 p. 20).

**F** Fassa: in Wäldern bei Alba; Fleims: Waldränder bei Cavolonte (Vent. 22 p. 2); Primör: unterhalb San Martino 1400 m (Degen b. Mat. 4 p. 6).

**T** Paganella: bei der Malga di Fai, an der Paganella auch var. minor C. Mass. (Vent. 22 p. 2).

**R** Zwischen Tenno und Riva (Vent. 22 p. 2), Varone (Rechinger b. Mat. 2 p. 187); Rovereto (Crist. 1 p. 346; b. DT. 10 p. 219, Hb. F.); am Wege von Mezzomonte nach Folgaria (Vent. 22 p. 2).

#### 16. *Marchantia* L., em., Raddi.

1. (24.) **M. polymorpha** L., Spec. pl. (1753) p. 1137, *M. polymorpha* var. *domestica* Wahlenb., Fl. lapp. (1812) p. 397 und var. *fontana* Wahlenb. *ibid.* l. c. p. 398. — Dum. p. 150 Nr. 1; Steph. VII. p. 392 [Sep. p. 164] Nr. 4.

Gemein von den Niederungen bis 2500 m (**M** Stilsferjoch, **E** Wolfendorn: Peyr.) an feuchten Standorten aller Art: Quellsümpfen, tropfenden Felsen, feuchtschattigen Mauern, im Grunde der Erlenauen, an den Seiten und Rändern von Gräben, Wasserleitungen etc., an nassen, mageren Wiesenstellen. — Für **N**, **F**, **G** nicht angegeben. — Bereits im Herbarium von Guarinoni enthalten als „*Hepatica*, Leberkraut“ (siehe Kern. 32 p. 179).

Var. *aquatica* Nees, Naturg. eur. Leberm. IV. (1838) p. 65 als *M. polymorpha* A. communis  $\alpha$  *aquatica*.

**V** Bregenz: Schleifertobel, massenhaft (Blumr. b. Mat. 5 p. 90).

**I** Innsbruck: Bach bei Mutters (Stolz b. Mat. 6 p. 18), Wasserfall in der Gluirsch, Ahrntal, Iglerswald mit *Conocephalus conicus* (Pkt. Hb. F.).

### III. Ordn. *Jungermanniales*.

#### 4. Fam. *Metzgerioideae*.

##### 17. *Riccardia* S. F. Gray em.

(*Riccardius* S. F. Gray, *Aneura* Dum.)

1. (25.) **R. multifida** (L.) S. F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Pl. I. (1821) p. 683, *Jungermannia multifida* L., Spec. pl. (1753) p. 1136. *Aneura multifida* Dum., Comm. bot. (1822) p. 115. — Dum. p. 141 Nr. 1; Steph. VII. p. 727 [Sep. p. 237] Nr. 60.