

B Am Ritten und bei Seis (Hsm. b. Mat. 4 p. 6); Seis: auf faulem Holze beim Strasserbrünnl (Hsm. b. Bagl., Ces. & De Not. 1 Nr. 718).

F Fleims: an morschen Baumstrünken in Wäldern bei Cavelonte (Vent. 22 p. 2).

4. (28.) **R. latifrons** Lindb., *Aneura latifrons* Lindb. in Notiser Sällsk. fauna et fl. fenn. Förh. XIII. (1874) p. 372, *Riccardia latifrons* Lindb. in Acta soc. sc. fenn. X. (1875) p. 513. — Steph. VII. p. 758 [Sep. p. 268] Nr. 137.

V Feldkirch: mit *R. palmata* auf faulem Holz im Walde am Nordabhange des Aelple (Loitl. 1 p. 250).

T Paganella: knapp unter dem Gipfel auf Erde über Kalkfelsen (Vent. 22 p. 2).

5. (29.) **R. pinguis** (L.) S. F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Pl. I. (1821) p. 683, *Jungermannia pinguis* L., Spec. pl. (1753) p. 1136, *Gymnomitrium pingue* Hüb., Hepaticol. germ. (1834) p. 41, *Aneura pinguis* Dum., Comm. bot. (1822) p. 115. — Dum. p. 143 Nr. 5; Steph. VII. p. 762 [Sep. p. 272] Nr. 149.

V Feldkirch: Rinnsale bei Amerlügen, Rheinauen (Loitl. 1 p. 250); Winkertobel bei Dalaas (Loitl. 1 p. 249; siehe auch p. 244 *Jungermannia* Müllerj).

O Oetzthal: an einer Quelle zwischen Brand und der Kaiserbrücke (Stotter & Hfl. 1 p. 112).

I Innsbruck: Sandplätze unter Gebüsch am Inn außer Mariabühl (Hfl.), an einer Quelle ober Hötting, Titschenbrunnen 1200 m (Stolz b. Jack 2 p. 187; b. Mat. 6 p. 18), am Bache bei Mühlau (Hfl. b. Pkt. 3 p. 150; Handel, det. Mat.), Kalktuff an der Quelle im Weitental 790 m (Kern. Hb.), bei der Hölbrücke mit *Trichocolea tomentella*: *a tenuis* Nees, Naturg. eur. Leberm. III. (1838) p. 427 sub *Aneura* (Pkt. 3 p. 150), in den nassen Wiesen hinter der Gallwiese (Leithe 2 p. 43), moorig-quellige Waldstelle unter dem Plumesköpfl (Baer b. Mat. 1 p. 221), Siltschluchten (Murr b. Mat. 3 p. 73), häufig am Wege nach Vill auf lehmhaltigem Boden und feuchtem Tonschiefer: var. *lobulata crassior* Nees, Naturg. eur. Leberm. III. (1838) p. 427 sub *Aneura* (Pkt. 3 p. 150), am Wege nach Taxburg auf lehmhaltigem Sandboden (Pkt. b. DT. 10 p. 221, Hb. F. als var. *lobulata crassior*, aber in der Normalform), unter Moosen an schattig-feuchten Stellen im Iglerswalde (Pkt. b. DT. 10 p. 221, Hb. F. als *β fasciata* Nees, l. c. p. 429, aber in der Normalform), Waldsumpf bei Aldrans: f. *tenuis* (Kern. Hb.); Voldertal: auf den Felsen neben dem Wasserfalle und an anderen Orten (Leithe 2 p. 43).

U Kufstein: Thierberg (Jur. 9 p. 12).

M Meran: an einer erdigen Stelle am Grunde der Wassermauer in Algund (Milde 30 p. 9).

E Gilfenklamm bei Sterzing (Pfaff b. Mat. 3 p. 73).

P St. Martin in Gsies (Simmer); Ampezzo: Cristallotal 16—1650 m am Fuße überhängender Wände in der Traufe (Mdo. 3 p. 438).

D Burgertal bei Aßling (Simmer); Lienz: an nassen Kalkfelsen auf Moosen, unter Gneißblöcken (F. Saut. 4 p. 180).

N Rabbi: am Bache beim Sauerbrunnen (Vent. 22 p. 2).

T Trient, an der Etsch (Vent. 22 p. 2).

R Monte Baldo: auf feuchter Erde in der Höhlung der Quelle „dei Coltri“ (Poll. 3 III. p. 387).