

V Kloostertal: Felsen im Winklertobel bei Dalaas; Montavon: im Rellstal zwischen Blasia (Loitl. 1 p. 241).

27. Aplozia Dum.

(incl. *Solenostoma* Steph.)

1. (64.) *A. caespiticia* (Lindenb.) Dum., *Hepat. Europ.* (1874) p. 61, *Jungermannia caespiticia* Lindenb., *Syn. Hepat.* (1829) p. 67 tab. 1 fig. A, *Solenostoma caespiticia* Steph. in *Bull. Herb. Boissier* 2. sér. I. (1901) p. 495. — Dum. p. 61 Nr. 16; Steph. (2) I. p. 495 [Sep. II. p. 57] Nr. 23.

I Sellrain: Kraspesthal 2100 m (Stolz b. Jack 2 p. 179 als *Jungermannia „caespitosa“*).

2. (65.) *A. amplexicaulis* Dum., *Jungermannia amplexicaulis* Dum., *Hepat. Eur.* (1874) p. 60, *Solenostoma amplexicaulis* Steph. in *Bull. Herb. Boissier* 2. sér. I. (1901) p. 496, *Jungermannia cordifolia* Martius, *Fl. crypt. erlang.* (1817) p. 183 non Hook. *Brit. Jungerm.* (1816) tab. 32, *J. tersa* Nees, *Naturg. eur. Leberm.* I. (1833) p. 329, *Aplozia tersa* Bernet, *Catal. Hepat. Sud-Ouest Suisse* (1888) p. 61. — Dum. p. 60 Nr. 13; Steph. (2) I. p. 496 [Sep. II. p. 58] Nr. 25.

V Bregenz: Rappenlochschlucht (Blumr. b. Mat. 1 p. 223); Kleines Walsertal: Mahdertal bei Riezlern 1300 m (Holl. 5 p. 74).

O Oetzal: Längental bei Kùhetal (Stolz b. Mat. 6 p. 24), Rotmoostal bei Gurgl 22—2300 m (Breidl. 4 p. 306).

I Sellrain: Gleirschtal 2200 m (Stolz b. Mat. 6 p. 24), oberhalb Schönlisens 22—2600 m (Stolz b. Jack 2 p. 179), Muttererjoch 2600 m; Innsbruck: Axamergraben, (Stolz b. Mat. 6 p. 24), am Wasserfällchen in der Geroldschlucht (Leithe 2 p. 45), Sonnenspitze am Glungezer (Stolz b. Mat. 6 p. 24), Tulflein 2100 m [nicht Tulfes] (Stolz b. Jack 2 p. 179); Stubai: Oberiß gegen Alpein, Schiefer 2050 m, Kirhdachscharte 2480 m (Kern. Hb.).

K Kitzbühel: unter tiefenden Felsen des Schroffpalven, Kalk, im Spertentale 1300 m (Eng. 8 p. 258).

M Meran: auf Felsen (Bamb. Hb. F. als *Jungermannia confertissima*).

P Staller-See in Antholz in kalten Quellen 1900 m (Hsm. b. Bagl. Ces. & De Not. Nr. 216 (1216); b. Mat. 4 p. 7).

D Lienz: Neualpl im Glimmerschiefersande bei 2600 m mit *f. explanata* (Nees), *Jungermannia tersa* β *explanata* Nees, *Naturg. eur. Leberm.* II. (1836) p. 471 (F. Saut. 4 p. 130).

? **R** Monte Baldo: Cassone (C. Mass. 1 p. 8).

3. (66.) *A. lanceolata* (Hook.) Dum., *Hepat. Eur.* (1874) p. 58, *Jungermannia lanceolata* Hook., *Brit. Jungerm.* (1816) tab. 28 non L. *Spec. pl.* (1753) p. 1131; vergl. Schiffa. in *Lotos Neue Folge* XXI. (1901) p. 203, ferner Nees, *Naturg. eur. Leberm.* I. (1836) p. 342, *Lioclaena lanceolata* Nees in Gottsche, *Lindenb. et Nees, Syn. Hepat.* (1844) p. 150, *Solenostoma lanceolata* Steph. in *Bull. Herb. Boissier* 2. sér. I. (1901) p. 498. — Dum. p. 58 Nr. 10; Steph. (2) I. p. 498 [Sep. II. p. 60] Nr. 28.

V Schröcken; Samina- und Gamperdental, Nenzigast; an Gneiß im Rellstal (Loitl. 1 p. 243), Waldtobel bei Tschagguns (Jack 2 p. 183).