

p. 23); Ueberetsch: Matschatsch 900 m (Hfl. b. Mat. 2 p. 187); Salurn: an Kalkfelsen der Haderburg (Zickendr. l. c.).

R Monte Baldo: auf Kalkfelsen an dem von der Alpe Montagnola gegen Prada herabfließenden Bache (Vent. 22 p. 8).

35. Mylia S. F. Gray, em.

(Mylus S. F. Gray, *Leptosecyphus* Mitten, *Coleochila* Dum.)

1. (106.) **M. Taylori** (Hook.) S. F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Pl. I. (1821) p. 693 sub Mylius, *Jungermannia Taylori* Hook., Brit. Jungerm. (1816) tab. 57, *Coleochila Taylori* Dum., Hepat. Eur. (1874) p. 106. — Dum. p. 106 Nr. 1.

Tirol (Funck b. Hüb. 2 [1834] p. 75).

V An morschem Holze: bei den Wasserfällen im Mellautal, bei Schröcken; an Holz und Felsen im Nenzigast, am Kristberg ein isolierter ♀ Rasen (Loitl. 1 p. 242).

O Gepatsch im Kaunertal 2000 m (Stolz b. Jack 2 p. 179).

I Nördliche Kalkkette: Schlauchkar bei der Hochalpe 1700 m (Stolz b. Mat. 6 p. 23), Hinterautal (Hfl.), Plumsjoch auf Seite des Rißtales (Leithe 2 p. 45), Vomperloch, an einem faulen Baumstrunke am Steige gegenüber der Melanseralpe 1000 m (Handel, teste Mat.); Sellrain: Kraspestal 1900 m (Stolz b. Jack 2 p. 179), häufig in Lisens gegen die Burwand (Pkt. 3 p. 153), unter dem Karrljoeh in einer triefenden Felsenquelle (Pkt. 3 p. 153; b. DT. 10 p. 227, Hb. F.), Alpe Stockach 2000 m, Votschertal 19–2000 m (Stolz b. Jack 2 p. 179 und in litt.; die Höhenzahl 1895 b. Jack bezieht sich auf das Jahr); Voldertal: zwischen dem Kläusl und der Gwanalpe: forma β * Nees, Naturg. eur. Leberm. I. (1833) p. 299, auf morschem Holze am Wege zwischen der Vorbergalpe und den Steinkasern (Leithe 2 p. 45), Gwanalpe 1050 m; Viggar 1900 m (Stolz b. Jack 2 p. 179); Gebiet von Steinach: an Quellen der Bergwälder (F. Saut. 4 p. 179); Gleinser-See zwischen Sphagnen mit festem, feuchtem Torf (Kern. Hb.); Gschnitztal: an beschatteten, felsigen Stellen bei Laponas, 2000 m (Kern. 78^a Nr. 1133, 78^b III. p. 158); Valsertal 18–2000 m (Stolz b. Jack 2 p. 179).

U Kufstein: im Walde am Längensee (Hfl. b. Jur. 9 p. 13), auf dem Hinterkaiser mit *M. anomala* (Jur. l. c.).

K Kitzbühel: am Rande der Wälder im Ansteigen des Horns (Ung. 8 p. 259).

E In Pfitsch (Hfl. b. Pkt. 3 p. 153).

P Gsieserjöchel an quelligen Orten (F. Saut. 4 p. 179).

D Lienz: Kerschbaumer Alpe auf faulem Holze an Quellen 1500 m (F. Saut. 4 p. 179).

B Ladensumpf auf der Rittneralpe mit *Mnium punctatum* (Hsm. Hb.).

2. (107.) **M. anomala** (Hook.), S. F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Pl. I. (1821) p. 690, *Jungermannia anomala* Hook., Brit. Jungerm. (1816) tab. 34, *Coleochila anomala* Dum., Hepat. Eur. (1874) p. 106, *Jungermannia Taylori* var. *anomala* Jur. in Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) p. 13, *Mylia Taylori* var. *anomala* Loitl. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLIV. (1894) p. 243. — Dum. p. 106 Nr. 2.

V Bregenzerwald: auf morschen Stränken bei Mellau (Jack b. Rbh. & Gottsche 1 Nr. 593 als *Jungermannia Taylori*; Jack 2 p. 179); über