

abgestorbenem Sphagnum auf der Galgenwiese bei Feldkirch und im Klostertal bei Braz und Dalaas in eine sehr laxe Moorform übergehend, welche näher beschrieben wird (Loitl. 1 p. 245, 246; siehe auch Folgende).

I Gschnitztal: oberhalb Gschnitz auf faulem Holze, Sondestal 1600 m auf Urgebirgsdetritus mit *C. bicuspidata* (Patzelt, det. Schiffn.).

6. (120.) *C. connivens* (Dicks.), Lindb. in Journ. Linn. soc. XIII. (1872) p. 191, Spruce, On Cephalozia (1882) p. 46, Jungermannia *connivens* Dicks., Fasc. pl. crypt. IV. (1801) p. 19 tab. 11 fig. 15, *Blepharostoma connivens* Dum., Rev. Jungerm. (1835) p. 18. — Dum. p. 96 Nr. 3.

V Feldkirch: über abgestorbenem Sphagnum auf der Galgenwiese und den umliegenden Sumpfwiesen, mit *Cephalozia media* und *C. pleniceps* oft durchwachsen, (Loitl. 1 p. 245; b. Beck & Zahlbr. 1^a Nr. 279, 1^b XII. p. 95); Montavon: im Walde bei Tschagguns (Jack 2 p. 182).

O Kùhetal 2000 m (Stolz b. Jack 2 p. 182).

I Karwendeltal: am Grabenkar bei der Hochalpe 1900 m auf Humus unter Latschen (Stolz b. Mat. 6 p. 30); Sellrain: Gleirschtal bei St. Sigmund (Pkt. Hb. F.), Lisens gegen den Fernerboden an morschen Baumwurzeln (Pkt. Hb. F. in einem als *Jungermannia incisa* bezeichneten Gemische ohne letztere Art: siehe Pkt. 3 p. 147; b. DT. 10 p. 224; ein anderes Exemplar von dort ist jedoch wieder als *J. incisa* richtig bestimmt), unter dem Karrljoche beim See zwischen Felsenritzen (Pkt. 3 p. 145; im Hb. F. in einem als *J. Conradi* bezeichneten Gemische), Lisens, zwischen Sphagnen (Stolz b. Mat. 6 p. 30); Innsbruck: im Iglerswalde bei Taxburg an faulen Stöcken (Pkt. 3 p. 148 als *J. incisa*; siehe aber DT. 10 p. 224), Rinnerberg 1000 m, Patscherkofel (Stolz b. Mat. 6 p. 30), an Baumwurzeln am Wege zum Glungezer (Pkt. b. DT. 10 p. 226, Hb. F.); an Felsen beim Wasserfalle im Voldertale (Leithe 2 p. 44).

U Achental: Kotalmjoch 1260 m mit *Dicranodontium longirostre* (Kern. Hb.); Kufstein: unter *Sphagnum cuspidatum* auf dem Hinterkaiser (Jur. 9 p. 12).

K Kitzbühel: an begrasten Stellen der Wälder, vorzüglich im Bichlach (Ung. 8 p. 259).

E Pfitsch: in Rasen von *Bartramia pomiformis* am Hochfeiler 3000 m, steril (Baer b. Mat. 2 p. 188).

D Lienz: auf morschem Holze der Wälder (F. Saut. 4 p. 132).

B Ritten: Waldhohlweg im Krotentale (Hsm. Hb.).

T An morschen Strünken in den Wäldern der Alpe Montagna Grande di Pergine (Vent. 22 p. 5).

NB. Von den älteren Angaben dürften sich einige auf *C. symbolica* beziehen.

41. Nowellia Mitten.

1. (121.) *N. curvifolia* (Dicks.) Mitten in Godman, Nat. Hist. Azores (1870) p. 321, *Jungermannia curvifolia* Dicks., Fasc. pl. crypt. II. (1790) p. 15 tab. 5 fig. 7, *Cephalozia curvifolia* Dum., Rec. d'observ. (1835) p. 18, *Jungermannia Baueri* Martius, Fl. crypt. erlang. (1817) p. 172, *J. curvifolia* ♂ *Baueri* Lindenb. in Nova Acta Acad.