

nat. cur. XVIII. Suppl. (1829) p. 92, *Cephalozia curvifolia* β Baueri Dum., *Hepat. Eur.* (1874) p. 93. — Dum. p. 93 Nr. 13.

„In Kärnthen, Tyrol und Salzburg (Bauer, Martius, Hoppe)“ (Hüb. 2 [1834] p. 163, 164 als *Jungermannia Baueri*).

V Bregenz: Laiblachtal (Loitl. 1 p. 246), Weiße Reute (Blumr. b. Mat. 2 p. 188), Bregenzerwald: Mellau (Jack 2 p. 182); Feldkirch: Ardetzenberg, Känzele, Samina- und Gamperdental (Loitl. 1 p. 246); Montavon: im Waldtobel bei Tschagguns auf morschem Holze und an Fichtenrinde (Jack 2 p. 1-2).

L Bei Schattwald (Brugger b. Jack 2 p. 182).

O Oetzthal: bei Vent gegen den Ferner (Hfl. b. Pkt. 3 p. 146).

I Auf faulen Baumstrünken im Hippentale jenseits der Frauhitt (Leithe 2 p. 44); Schwaz: Baumstrunk am Wege nach Georgenberg (Handel, teste Mat.).

K Kitzbühel: am Horn (Saut. 4 p. 28 als *Jungermannia Baueri*), gemein auf faulenden Baumstrünken im Bichlach, Winklerwalde u. s. w. (Ung. 8 p. 259 als *J. Baueri*).

E Auf dem Penserjoche (Hfl. b. Pkt. 3 p. 146).

D Lienz: auf faulem Holze der Wälder (F. Saut. 4 p. 131).

R Monte Baldo: Acque negre (C. Mass. 1 p. 10).

42. *Hygrobiiella* Spruce.

1. (122.) *H. laxifolia* (Hook.) Spruce, On *Cephalozia* 1882 p. 75, *Jungermannia laxifolia* Hook., Brit. *Jungerm.* (1816) tab. 59, *J. Huebneriana* Nees, *Naturg. eur. Leberm. II.* (1836) p. 316, *Gymnocolea Huebneriana* Dum., *Hepat. Eur.* (1874) p. 64. — Dum. p. 64 Nr. 1 (*G. latifolia*) und Nr. 2 (*G. Huebneriana*).

I Stubai: ober der Nürnberger Hütte 2400 m (Stolz b. Mat. 6 p. 29).

2. (123.) *H. myriocarpa* (Carringt.) Spruce, On *Cephalozia* (1882) p. 75, *Jungermannia myriocarpa* Carringt. in *Trans. Bot. Soc. Edinburgh XIII.* (1880) p. 466 tab. 18 fig. 4.

V In einer nassen Felsennische längs des Salonienbaches im Rellsthal, ca. 1200 m in kleinen, ♀ und ♂ Pflanzen bergenden Räschen mit ganz entwickelten Perianthien. Später nicht mehr gefunden (Loitl. 1 p. 246, 247).

43. *Cephaloziella* Spruce.

1. (124.) *C. Raddiana* (Mass.) Schiffn. in litt., *Jungermannia Raddeana* C. Mass. in *Atti Soc. veneto-trent. sc. nat. VI. 2.* (1879) p. 144.

R Revoltpaß (C. Mass. 4 p. 145).

2. (125.) *C. divaricata* (Sm.) Schiffn. in *Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. I. 3.* (1893) p. 99, *Cephalozia divaricata* Dum., *Hepat. Eur.* (1874) p. 89, *Jungermannia divaricata* Smith, *Engl. Bot. tab.* 719 (1800) sec. Spruce, *Cephalozia byssacea* var. *divaricata* Vent., *Muscin. Trent.* (1899) p. 5, *J. Starkii* Funck b. Nees, *Naturg. eur. Leberm. II.* (1836) p. 223, *Cephalozia Starkii* Breidl. in *Mittheil. naturwiss. Ver. Steierm. XXX.* (1893) p. 326, *Jungermannia byssacea* Roth, *Fl. germ.* (1800) p. 307 sec. spec. orig. fide Heeg in *Verh. zool. bot. Ges.*