

klüften ober Laponen 1700 m (Stolz b. Jack 2 p. 184), Vinaders (Sarnth. b. Mat. 5 p. 92), Navis 1500 m, Grat der Klammerspitze bei St. Jodok 23—2500 m (Stolz b. Jack 2 p. 184).

U Achental: auf Baumwurzeln in Falzthurn 1000 m (Handel b. Mat. 4 p. 49); Kufstein: am Thierberg (Jur. 9 p. 12); Zillertal: minor (Web. & Mohr 1 p. 406), Eingang der Stillupp (Sarnth. b. Mat. 5 p. 92).

K Gemein am quelligen Lehm Boden der Wälder (Ung. 8 p. 259).

M Meran: Fineleloch (Stolz b. Mat. 6 p. 34).

E Brenner auf Kalktuff: var. *Sprengelii* (Martius), *Jungermannia Sprengelii* Martius, Fl. crypt. erlang. (1817) p. 133, *Calypogeia Trichomanis* α 3 *Sprengelii* Nees, Naturg. eur. Leberm. III. (1838) p. 9 (F. Saut. 4 p. 179).

P Mühlbach auf feuchtschattigem Humus, auf Moorerde bei St. Magdalena in Gsies (Simmer).

D Tauern: Gschlöß 1600 m in einer abweichenden Form (Stolz b. Jack 2 p. 184), Hopfgarten, Sillian, Ainet, Tristach, auf feuchtschattigem Humus (Simmer); Lienz: auf Lehm Boden, faulem Holze; var. *Sprengelii* (Martius), Schloßberg; f. *repanda* Nees l. c. sub *Calypogeia*, Neualpl, Glimmerschiefer bis 2400 m (F. Saut. 4 p. 179).

N Rabbi, in Wäldern (Vent. 22 p. 4; Stolz b. Mat. 6 p. 34).

B Ladensumpf auf der Rittneralpe, Klobenstein (Hsm. Hb.).

F Fleims: Cavelonte in Wäldern (Vent. 22 p. 4); Primör: Val Cigolera auf Erde und Holzstrünken (Degen b. Mat. 4 p. 8).

G Val Vestino (Porta b. Mat. 1 p. 223).

T Häufig an schattigen Orten am Wege von Falesina zur Alpe Montagna Grande di Pergine und bei Vetriolo (Vent. 22 p. 4), Monte Selvot (Pfaff b. Mat. 3 p. 75).

R Monte Baldo: Acque negre (C. Mass. 4 p. 11).

Var. *Neesiana* C. Mass. et Carestia in Nuovo Giorn. bot. ital. XII. (1880) p. 351 tab. XI. fig. 3. *Calypogeia Trichomanis* α 3 *Sprengelii* β *amphigastriis* *subintegrus* aut *leniter retusus* Nees, Naturg. eur. Leberm. III. (1838) p. 9.

V Klostertal: Formarinhöhe neben Mylia und Cephalozien 1800 m (Loitl. 1 p. 248).

F Primör: auf Rinde im Val Calda 1465 m (Degen b. Mat. 4 p. 8).

46. *Bazzania* S. F. Gray em.

(*Bazzanius* S. F. Gray, *Mastigobryum* Gottsche, Lindenb. et Nees, *Pleuroschisma* Dum.)

1. (133.) **B. trilobata** (L.) S. F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Pl. I. (1821) p. 704 als *Bazzanius*, *Jungermannia trilobata* L., Spec. pl. (1853) p. 1133, *Mastigobryum trilobatum* Nees in Gottsche, Lindenb. et Nees, Syn. Hepat. (1844) p. 230, *Pleuroschisma trilobatum* Dum., Hepat. Eur. (1874) p. 103, *Jungermannia radicans* Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 87. — Dum. p. 103 Nr. 1.

V Bregenz: am Tobel zwischen Berg Isel und Weißenreute (Blumr. b. Mat. 5 p. 92), Mellau (Jack 2 p. 184); Victorsberg, Waldesrand der Galgenwiese bei Feldkirch, Großes Walsertal, Nenzinger Berg im Gamperdon; Montavon: Fratte (Loitl. 1 p. 248), Silbertal (Jack 2 p. 184).