

Zwergweiden und Erdflechten 2530 m (Arn. 4 XIV. p. 475; b. Rbh. & Gottsche 1 Nr. 606; b. Jack 2 p. 183).

E Pfunderertal, mehrfach (Simmer).

P Meist in reinen Beständen in solchen Mulden der Hochalpen, welche bis Ende Mai von Schneewasser frei sind: Hegedexspitze, Campill, Kronplatz, Rautal, Welsberg 14—2000 (Simmer).

D Matreier Tauern (Funck 1 Nr. 618 [1824]; b. DT. 10 p. 224, Hb. F.), Kalsertörl (Funck b. Nees 1 p. 131; 2 II. p. 307), im Iseltale mehrfach bis 1000 m herab (Simmer); Lienz: Schleinitz 3000 m (F. Saut. Hb. F.), Neualpl auf Glimmerschiefer 2600 m (F. Saut. 4 p. 132), Kerschbaumeralpe (Simmer).

N Rabbital; bei der Alpe Sorasass oberhalb San Bernardo, mit anderen Lebermoosen (Vent. 22 p. 5).

52. *Herberta* S. F. Gray.

(Schisma Dum., Sendtnera Nees.)

1. (142.) **H. straminea** (Dum.) Trevisan in Mem. Istit. Lomb. sc. e lett. XIII. (1877) p. 397 (als „*Herbertia*“ *straminea*), Schisma *stramineum* Dum., Sylloge Jungerm. (1831) p. 77, Sch. Sendneri Nees, Naturg. eur. Leberm. III. (1838) p. 575, Jungermannia *Sauteriana* Hüb. et Genth, Deutschl. Leberm. Nr. 108 (1839), Sendtnera *Sauteriana* Nees b. Gottsche, Lindenb. et Nees, Syn. Hepat. (1844) p. 240. — Dum. p. 124 Nr. 2.

O Kùhetal: am Grunde der größeren Blöcke im Gneißgerölle am Wege zu den Finstertaler Seen 1950 m (Arn. 4 XIV. p. 449; b. Mat. 1 p. 224; Lojka b. Kern. 78^a Nr. 1535, 78^b IV. p. 97).

I Flaurlinger-See 2450 m (Stolz b. Mat. 6 p. 35); Roßkogel: Inzingerberg auf Glimmerschiefer bei 2270 m in dichten Rasen mit Jungermannia *minuta*, *Dicranum interruptum*, *Cladonia amaurocraea* (Sendtn. b. Nees 2 III. p. 575 [1838]; Sendtn. b. Gottsche, Lindenb. & Nees 1 p. 240), Roßkogel 1900 m (Hfl. b. Pkt. 3 p. 151); „Wägen voll könnte ich holen, hatte mir einst Sendtner gesagt und so stieg ich denn eines Tages, 1. September 1851, als glücklicher Besitzer von 500 Exemplaren den Roßkogel herab. In dankbarer Erinnerung an Sendtner nahm ich das stattliche Lebermoos bei einem zweiten Besuche des Berges, 10. August 1867, abermals mit (Arn. 4 III. p. 950; b. Rbh. & Gottsche 1 Nr. 33 b: Roßkogel in einer Höhe von ca. 5000' stets steril — und Nr. 422*)“; der Sendtner'sche Original-Standort wird von Arn. 4 XVII. p. 557 sodann noch genauer mitgeteilt; Roßkogel 1900 m (Hfl. b. Pkt. 3 p. 151), daselbst 2200—2530 m mit *Mastigobryum deflexum* (Kern. Hb.), Inzingeralpe unfern des Sees (Leithe 2 p. 92), in prachtvollen Rasen gemein unter Schiefergestein südwestlich von der Krimpenbachalpe 20—2100 m (Handel b. Mat. 4 p. 9); Sellrain: im Längentale am Fernerkogel zwischen Gneißblöcken, neben dem Semmelbach auf ödem Grund 2273 m (Pkt. 3 p. 151; b. DT. 10 p. 226, Hb. F.); zwischen Gerölle am Wege zum Glungezer (Pkt. 3 p. 151; 7 p. 143; b. DT. 10 p. 226, Hb. F.), zwischen Gerölle in Löchern im Anstieg zum Kreuzjoch (Pkt. 3 p. 151; b. DT. 10 p. 226, Hb. F.), auf dem Rosenjoch im Voldertale in Felsklüften 2650 m (Stolz b. Jack 2 p. 185).

*) »Am Stoßkogel bei Lösbrudli« [Innsbruck] auf Erde zwischen Glimmerschiefergerölle.