

**M** Meran: am Marlingerberg (Milde 30 p. 6).

**E** Brennerbad (F. Saut. Hb.).

**P** Bei Welsberg (Gand.).

**D** Innervillgraten: am Milikofel; Innichen: an Kalkfelsen; am Winklerbache bei Kartitsch (Simmer); Lienz: an der alten Stadtmauer an den Wänden eines alten Kalkofens zwischen Amlach und Tristach, an der Kärntnergrenze bei Nikolsdorf (Gand. Mscr. u. b. Jur. 20 p. 14), Rauchkofel (F. Saut. Hb.).

**B** An einem verwitterten Sandsteinblocke dicht vor Kastelruth mit zahlreichen Früchten (Milde 29 p. 14), ebendort an Nagelfluhfelsen, Kalk 1100 m (F. Saut. b. Kern. 78<sup>a</sup> Nr. 738, 78<sup>b</sup> II. p. 156); Ratzes (Milde 21 p. 24), in Höhlen am Dolomit bei Hauenstein (Milde 29 p. 8); Bozen: am Calvarienberg (Milde 22 p. 53), Kühhach (F. Saut. Hb.).

**T** Trient: an Kalkfelsen längs der Straße zum Fort Vela (Vent. 7 p. 51; 22 p. 17), gegen Vezzano (Wagner), Kalkfelsen am oberen Teile des Salébaches bei Povo (Vent. 22 p. 17).

**R** Arco: Felsspalten bei San Paolo im Sarcatale (Diettr. b. Warnst. 9 p. 7).

Var. *gracile* Breidl. in sched.

**I** Innsbruck: an Mauern der Brennerstraße zwischen Schönberg und Patsch, Schiefer 900 m (Handel b. Mat. 4 p. 11).

### 13. *Gyroweisia* Schimp.

1. (51.) *G. tenuis* (Schrad.) Schimp., *Gymnostomum tenue* Schrad., *Trichostomum reflexum*  $\beta$  *gymnostomum* Lindb. — Limpr. I. p. 235 Nr. 66, III. p. 642.

Tirol (Hüb. 1 [1833] p. 47).

**V** Bregenz: am Bahnviaducte in Lochau, fruchtend, an Mauern beim Gymnasialspielplatze steril, im Fuchstobel mit *Seligeria recurvata* (Blumr. b. Mat. 5 p. 93; 3 p. 76).

**I** Innsbruck: Straßendämme des Fürstenweges (Wagner); am Blaser bei 2000 m, fruchtend (Baer b. Mat. 3 p. 76).

**P** Buchenstein: bei einer Mühle nächst Pieve auf Sandstein 1430 m, steril (Mdo. 5 p. 99; b. Litz. & Mdo. 2 p. 452).

**D** Windischmatrei: auf Tuff-absonderndem Kalkglimmerschiefer bei Stein, selten, 1170 m (Mdo. b. Litz. & Mdo. 1 p. 83; Mdo. 6 p. 82).

**R** Arco: auf feuchtem Sandstein bei 90 m, fruchtend (Diettr. teste Mat.), am Varonewasserfall (Röll 1 p. 659).

Var.  $\beta$  *badia* Limpr. I. p. 236.

**V** Bregenz: auf Steinen am Bodenseeufer beim Bahnhofe, fruchtend (Blumr. b. Mat. 1 p. 226).

### 14. *Hymenostylium* Brid.

1. (52.) *H. curvirostre* (Ehrh.) Lindb., *Pottia curvirostris* Ehrh., *Weisia curvirostra* K. Müll., *Gymnostomum curvirostre* Hedw., *G. pomiforme*, *G. microcarpon* und *G. pallidisetum* Br. germ., ?*G. microcarpum*  $\gamma$  *elongatum* Hüb., Muscol. germ. (1833) p. 54. ?*Conostomum curvirostre* Bischoff in Flora VI. (1823) p. 265. — Limpr. I. p. 238 Nr. 67, III. p. 644.