

2200 m (Baer b. Mat. 4 p. 16); Sellrain: Neunerkogel im Kraspestale (Baer b. Mat. 4 p. 16). Haggen, Freihut, Grieser Grieskogel 2700 m, Lambsen, Muttererjoch im Votschertale (Stolz b. Mat. 6 p. 63), am Aufstiege zum Seejochl 2400 m (Handel b. Mat. 4 p. 16); Patscherkogel in humosen Felsnischen über Detritus des Schiefers, an schattigen, feuchten Erdabrissen, über torfigem Boden aus Azalea mit *Rhacomitrium lanuginosum*, *Solorina crocea* 2210 m, am Fuße schattiger Blöcke (Kern. Hb.), daselbst gegen die Neunerspitze (Baer b. Mat. 5 p. 95), Tulfein (Stolz b. Mat. 6 p. 63), Gipfel des Glungezer mit *Saxifraga bryoides* (Kern. Hb., Hb. F.), häufig auf Rasen am Glungezer und Haneburger 2400 m; Kellerjoch ober der Proxen- und Ulpenalpe 2000 m (Handel b. Mat. 4 p. 16); Stubai: ober dem Mannl am Vorkopf des Gschwätzgrates 2020 m (Kern. Hb.), ober dem Pinniserjoch gegen den Habicht (Kern. in Hb. Seilenstetten; Handel b. Mat. 4 p. 16); Tarntal 2210 m; Brenner, auf Glimmerschiefer (F. Saut. 1 p. 187); Klammer Spitze bei St. Jodok (Stolz b. Mat. 6 p. 63).

U Kuppe des vorderen Sonnwendjoches 2220 m auf torfähnlicher, feuchter Erde (Arn. 4 XII. p. 531); Zillertal: Hämmereralpe, großer Galtenberg, Thorhelm, Kreuzjoch (Herzog), Berliner Hütte (Röll 1 p. 660), Sondergrund am Boden (Ltz. 2 p. 1331).

K Windau: Filzkopf und Filzenscharte 1750—1850 m (Ltz. & Mdo. 1 p. 53; Mdo. 7 p. 218, 219), Hochfilzen (Ltz. & Mdo. 1 p. 109); Geissteingipfel (Saut. 33 p. 66; b. Jur. 20 p. 44; Mdo. 7 p. 230; Breidl.).

M Habicherkopf bei Graun 2800 m, Mittereck bei St. Valentin 2900 m (Breidl.); Prader Schafalpe in humosen Felsspalten auf Schiefer an der Zirbengrenze (Kern. Hb.), Stifserjoch, gegen die drei Länderspitze 2800 m (Breidl.); Sulden (Röll 1 p. 660): daselbst gegen Martell auf einem trockenen Grashange eine kleine gedrängte Form in Massenvegetation (Ltz. 3 p. 2).

E Brenner: Daxalpe, Hühnerspiel (Trautm. 1 p. 139).

P Taufers: Hörndljoch (Ltz. 2 p. 1330), im Geröll an der Nordseite der Pfaffenlücke 2840—2860 m (Ltz. 2 p. 1327; Mdo. 2 p. 399), Hirbanock bei St. Wolfgang (Berroyer b. Jur. 20 p. 44); Bruneck, Spitzhörndl, Tonschiefer (Reyer), Spitzhörndl 2138 m (Wagner b. Mat. 4 p. 16); Buchenstein: Örnella, linke Seite an den Absätzen der Schutthalden, steril (Mdo. 5 p. 202).

D Innervillgraten: reich fruchtend in Lärchwäldern an der Holzgrenze über den Gasserhöfen, eine Form mit schwach sichelförmigen Blättern in mächtigen Rasen im Ainettale (Gand.); Tauern: in der alpinen Region bis 2920 m verbreitet, auf Hornblende und Glimmerschiefergesteinen aller Art (Ltz. & Mdo. 1 p. 85), Gschlöß, feuchte Felsen, Möserling 2760 m auf Humus und in Felsklüften (Ltz. & Mdo. 1 p. 66, 64, 65), vielfach auf den Alpen der Venediger Gruppe und um Windischmatrei von 1500 m aufwärts (Breidl.), Frobnitztal: Musing 2984 m, Zunig 2680 m (Breidl. b. Jur. 20 p. 44), Alpen in Kals (Gand.), Gipfel des Gornitscham 2804 (Mdo. 7 p. 347); Lienz: Zettlersfeld (F. Saut. Hb.), Neualpl (Gand. b. Jur. 20 p. 44), Böses Weibele (Pokorny b. Jur. 20 p. 44; Gand.).

N Steril häufig auf allen Gipfeln des Sulzberg (Vent. 22 p. 22); Tonalepaß zwischen Gras in Massenvegetation (Ltz. 3 p. 57), hieher gewiß die Angabe: Adamello, reichlich fruchtend (Ltz. b. Arn. 4 XIV. p. 436, XXV. p. 406); Rabbital: einmal fruchtend in Felsritzen am Monte Campisol (Vent. 2 p. 169; 7 p. 52; 22 p. 21; b. De Not. 5 p. 628).