

B Bozen: Rodlerau auf bloßer Erde unter Bäumen (Hsm. Hb.), Wald bei der Aue (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 8).

T Am Abhange der Paganella auf Erdboden längs des Weges gegen die Malga di Fai; Trient: auf dem Uferschlamm der Etsch am Wege nach Ravina (Vent. 7 p. 51; 22 p. 26).

14. Fam. Seligeriaceae.

35. Seligeria Br. eur.

1. (142.) **S. Doniana** (Sm.) K. Müll., *Gymnostomum Donianum* Sm., *Anodus Donianus* Br. eur., *Seligeria Donii* Lindb. — Limpr. I. p. 461 Nr. 169.

I Hall: Salzberg gegen die Kaisersäule in dunklen Klüften 1580—1640 m (Kern. Hb. bot. Mus. Wien), auf Phyllit am Eingange eines alten Stollens am Wege ober dem Glockenhofe 700 m (Handel b. Mat. 4 p. 17); Schwaz: auf Kalkfelsen am Schlierbache zwischen Niederleiten und Troi 1000 m (Handel, teste Mat.); Gebiet von Steinach: an feuchten Tuff- und kalkhaltigen Schieferfelsen im Haupt- und am Eingange der Seitentäler bis 1420 m (F. Saut. 1 p. 188); Navis, nasse Kalkfelsen (F. Saut. Hb.), am Eingange des Tales (Fillion 1 p. 7; b. Jur. 20 p. 68), hinter der Kirche (Stolz b. Mat. 6 p. 67); Gschnitztal 1200 m; Steinacherberg 1260 m (Fillion l. c.); Steinacher Padaster; Kalktuff am Eingange des Schmirntales, Gries (F. Saut. Hb.); Griesberg 1600 m (Fillion l. c.).

U Zillertal: Gerlos, in einer dunkeln Felshöhlung auf Urkalk 1040—1070 m (Ltz. 2 p. 1317; Mdo. 2 p. 382; 8 p. 62).

K Windau: in der Thalenge hinter der vordersten Partie an triefenden, mürhen, Kalsinter abscheidenden Phyllitfelsen 810—850 m (Ltz. & Mdo. 1 p. 51, 88; Mdo. 7 p. 196); Kleiner Rettenstein (Saut. in Hb. F. Saut.).

P Kleinklausen im Ahrntale (Huter b. Jur. 20 p. 68); Ampezzo: Bergstürze zwischen Campo und Mortisa auf schattigen und feuchten Felsen 1230—1500 m, sehr spärlich (Mdo. 3 p. 594).

D Lienz: an Kalkfelsen beim Klammbrückekele (F. Saut. Hb.). [Die Angabe: bei Innervillgraten (Limpr. 7 l. p. 462) bezieht sich nach Gand. Mscr. auf *Gymnostomum calcareum*.]

[**T** Trient (Limpr. 7 l. p. 462), womit jedoch wohl folgende Standorte gemeint sind.]

R Monte Baldo: an Kalkfelsen längs des Baches bei der Alpe Montagnola (Vent. 22 p. 27); Ronchital bei Ala, an Kalkfelsen (Vent. 7 p. 53; 22 p. 27).

2. (143.) **S. pusilla** (Ehrh.) Br. eur., *Afzelia pusilla* Ehrh., *Weissia pusilla* Hedw. — Limpr. I. p. 463 Nr. 170.

V Bregenz: auf Sandstein am Abhange des Pfänder 7—800 m (Breidl.), Fuchstobel am Gebhardsberg, auf Nagellflube (Blumr. b. Mat. 2 p. 190), Krafttobel (Blumr., teste Mat.), Steinebach und Rappenlochschlucht (Blumr. b. Mat. 4 p. 17).

I Innsbruck: Kranebitter Klamm an feucht-schattigen Kalkwänden bei der oberen Mündung der Hundskirche 812 m (Hfl. 12 p. 177, das Exemplar im Hb. F. ist zweifelhaft; Kern. Hb.), am Eingange in