

V Drei Schwestern 2000 m: Rompel;

I Innsbruck: Sandhügel ober Mühlau: Murr (Mat. 1 p. 230).

Var. *brevifolium* Br. eur. II. *Distichium* p. 4. — *Limpr.* I. p. 515.

O Arlberg (Stolz b. Mat. 6 p. 71).

I Hafelekar gegen die Mannspitze (Stolz b. Mat. 6 p. 71).

M Sulden: auf grasigem Boden ober der Schaubachhütte 2800 m (Geheeb); Kirchbergtal in Ulten (Stolz b. Mat. 6 p. 71).

P Ahrntal (Hut. in Hb. Hsm.).

D Tauern: Zunig und Grödözkees bei Windischmatrei (Stolz b. Mat. 6 p. 71).

N Scaglia della Venezia im Pejotale; Gebirge von Sdernai im Rabbital (Vent. 22 p. 29).

B Ritten: am verlassenen Sandsteinbruche beim Buchermoor; Bozen: Grabenrand in Haslach, einzeln (Hsm. Hb.).

T Am Gipfel der Paganella (Vent. 22 p. 29).

Var. *commutatum* *Limpr.* I. p. 515.

Italienisches Tirol, in Mauerritzen, auf Kalk (Vent. 22 p. 29).

2. (159.) **D. inclinatum** (Ehrh.) Br. eur., *Azelia inclinata* Ehrh., *Cynodontium inclinatum* Hedw., *Cynodontium inclinatum* Brid. — *Limpr.* I. p. 515 Nr. 195.

V Lünensee, auf Rasenboden (Blumr. b. Mat. 5 p. 96); Montavon: Gafalljoch 22—2300 m (Breidl.).

L Grenzkamm: Rappen- und Linkerskopf, Kratzerpässe bis 2340 m (Mdo. 6 p. 146).

O Obladis, auf Glimmerschiefer 1330 m (Reyer).

I Nördliche Kalkalpen: Karwendel (Mdo. 8 p. 114), hinter der Frauhitt (Pkt. Hb. F. als *Didymodon capillaceus* var. *compactus*; b. DT. 10 p. 238), Gipfel des Hafelekar 2251 m (Stolz b. Mat. 6 p. 72); zwischen Sellrain und Gries (Kern.); Innsbruck: Saile, Sillschlucht hinter dem Berg Isel (Stolz l. c.), Heiligwasser (Kern.); Rosenjoch, Tarntalerköpfe bis 2300 m (Stolz b. Mat. 6 p. 72); Klammeralpe in Navis 1900 m (F. Saut. Hb.); Gschnitztal: Aufstieg zum Padaster an feuchten Kalkfelsen 1800 m (Kern. Hb.); Steinach 1100 m, Duxerjoch, auf kalkhaltigem Gestein (F. Saut. Hb., siehe 1 p. 188); Vinaders, auf Schiefer (Reyer).

U Zillertal: „im Salzburgischen“ (Floerke nach *Limpr.* I. p. 517), zwischen Freithof und Vorderdux (Sabransky, teste Mat.).

M „Stelvio“ (Bertol. 3 I. p. 234); Sulden: am Wege zur Schaubachhütte 2000 m (Geheeb); Passeier: Spronsertal unweit Langfall (Bamb.).

E Brenner: Wolfendorn 2500 m (F. Saut. Hb.), Brennerbad (Röll 1 p. 660).

P Ampezzo: häufig auf Dolomitgetrümmer in Höhlen; Peutelsteinklamm, Cristallotal 16—2014 m, Nuvolau 2470 m, Sasso di Formin bis 2660 m, Sorapiss, Faloria (Mdo. 3 p. 420, 439, 596, 599, 436); Buchenstein: Ornellatal, an bröckelnden, nassen Tuffgesteinen (Mdo. 5 p. 198).

D Innichen, Innervillgraten, Windischmatrei (Gand.); Tauerntal 950—1400 m (Bischoff 1 p. 265; Breidl.), Umbaltal 2000 m (Breidl.), mit