

3. (185.) *T. viridulum* Bruch, *T. crispulum* var. β *viridula* Braithw., *T. crispulum* γ *angustifolium* Br. eur. et δ *longifolium* Schimp. — Limpr. I. p. 577 Nr. 226, III. p. 698.

V Bregenzerwald: an der Straße von Schwarzenberg nach Egg (Reyer b. Limpr. 7 I. p. 579); Kleines Walsertal: Fellhorn auf Sandstein 1980 m (Mdo. 6 p. 144).

I Auf Kalkschutt am Steinacherberg (F. Saut. 1 p. 189, Hb.).

D Sandbänke des Tauernbaches bei Windischmatrei 950 m (Breidl. b. Limpr. 7 I. p. 579).

?**N** Pejotal: an der Moräne des La Mare-Gletschers, steril in Spuren, deren Identität zweifelhaft war (Vent. 22 p. 32).

4. (186.) *T. mutabile* Bruch. — Limpr. I. p. 579 Nr. 227.

U Bei Kufstein (Herzog).

D An Kalkfelsen zwischen Innervillgraten und Kalkstein (Gand.).

Var. ϵ *litorale* (Mitten) Dixon, *T. litorale* Mitten. — Limpr. I. p. 580, III. p. 698.

»Dieses Moos sandte ich an J. Hagen zu Trondhjem in Norwegen als *Weisia tortilis*. Er schickte mir hierauf das zweite Heft der von ihm herausgegebenen *Schedulae bryologicae* vom Jahre 1897. In diesem steht p. 6 Folgendes: »*Hanc speciem litoralem autem in Europa centrali re vera provenire probat specimen in Tirolia (Innervillgraten, in der Nähe des Milkofel 4900' circa) 9/9 1890 a rev. Gander lectum mihiq; sub nomine Weisiae tortilis missum, quod e caespitibus meris extensis Trichostomi litoralis constat.*« Nach genauer Untersuchung bestimmte ich dieses Moos noch einmal und halte es nun für *Trichostomum crispulum* Bruch.« (Gand. Mscr.; siehe auch Limpr. 7 III. p. 698).

5. (187.) *T. nitidum* (Lindb.) Schimp., *Didymodon nitidum* Lindb. — Limpr. I. p. 581 Nr. 228.

R Riva: auf dem Mörtel einer Mauer in einem Olivenhaine am See (Vent. 16 p. 62; 21 p. 452; 22 p. 32; b. Limpr. 7 III. p. 699).

6. (188.) *T. Bambergeri* Schimp. — Limpr. I. p. 582 Nr. 229.

M Meran: in Mauerritzen des Schlosses Ramez, leg. Bamb. 1853 (Schimp. 4 ed. 2 p. 174); jedoch, wie Vent. 22 p. 32 hervorhebt, vor dessen Restaurierung.

48. *Timmiella* De Not.

1. (189.) *T. anomala* (Br. eur.) Limpr., *Barbula anomala* Br. eur., *Trichostomum anomalum* Schimp. — Limpr. I. p. 592 Nr. 234.

M Meran (Bamb. 4 p. 664; b. Saut. 29 p. 63; b. K. Müll. 3 p. 361; b. Schimp. 4 ed. 1 p. 155, ed. 2 p. 178; Hb. F.); daselbst an Dorf- und Wassermauern, am Fuße von schattigen Felsen in Weingärten, an felsigen Abhängen, besonders aber am „Waal“ bei Algund und Gratsch eines der gemeinsten Moose, welches sich durch eine seltene Fruchtbarkeit auszeichnet. In seiner Gesellschaft finden sich meistens *Weisia viridula*, *Trichostomum rubellum*, *Leptotrichum glaucescens* (Milde 13 p. 448 etc.; b. Rbh. 8 Nr. 461), *St. Peter* (Bamb. in Hb. Hsm.), an den Ufermauern des Baches in Gratsch, reich fruchtend (Vent. 22 p. 32), oberhalb Plars auf der Erde unter Glimmerschieferfelsen, feuchte Felsen in der Schlucht oberhalb der Kirche von Gratsch