

D Lienz, fruchtend (Gand. b. Jur. 20 p. 145), daselbst auf faulen Holzdächern und an alten Baumstämmen (Gand.).

B Bozen: an Linden und Pappeln mit *T. pagorum*, z. B. am Loreto-plate (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 12, 11 Nr. 55); Auer: bei Castell Feder an der Rinde von Eichen nahe an deren Basis (Vent. 21 p. 452; 22 p. 38).

T Lavis: an der Basis von Pappeln längs des Avisio (Vent. 21 p. 452; 22 p. 38; Vent. & Bott. 1 p. 48).

15. (232.) *T. montana* (Nees) Lindb., *Syntrichia montana* Nees, *S. intermedia* Brid., *Tortula intermedia* Wils., *Barbula intermedia* Milde. — Limpr. I. p. 685 Nr. 281, III. p. 708.

V Brevenz: auf Nagelfluhfelsen am Wege zum Berg Isel, steril (Blumr. b. Mat. 2 p. 191).

O Landeck: oberhalb Perfuchs 1000 m, fruchtend (Baer b. Mat. 2 p. 191).

B Umgebung von Bozen, fruchtend (Wagner b. Mat. 4 p. 23, bei Rentsch (F. Saut. Hb.), bei Runkelstein und in Porphyrspalten im Eingange zum Eggentale, fruchtend (Mat. 3 p. 80); Kaltern, an Weinbergmauern; Salurn, auf Kalkfelsen bei der Haderburg (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 12).

T Trient, häufig an Kalk- oder Sandsteinfelsen, selten fruchtend: Buco di Vela, Weg von Ravina nach Romagnano, allo Specchio bei Martignano (Vent. 22 p. 39).

R Arco, auf Kalksteinen 140 m, fruchtend (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 12); Pieve di Ledro (Vent. 22 p. 39); Monte Baldo: am Gipfel des Corno della Paura (Vent. 7 p. 54; 22 p. 39).

16. (233.) *T. ruralis* (L.) Ehrh., *Bryum rurale* L., *Barbula ruralis* Hedw., *Syntrichia ruralis* Brid. — Limpr. I. p. 687 Nr. 282.

V Brevenz: Weißenreute, steril (Blumr. b. Mat. 3 p. 80).

?**L** Nicht angegeben, doch im Allgäu gemein bis in die Hochalpen (Mdo. 6 p. 146; 8 p. 101; Holl. 2 p. 74).

O Arlberg, steril: Landeck gegen Pians, fruchtend, hier auch mit asymmetrisch abgerundeten Blattspitzen (Stolz b. Mat. 6 p. 82), Ruine Schroffenstein, steril (Baer b. Mat. 3 p. 80); Schartlkopf bei Nauders 2808 m (Breidl.); Oetztal: an Felsen zwischen Längenfeld und Sölden (Stotter & Hfl. 1 p. 112; Hfl. b. DT. 10 p. 240, Hb. F.).

I An Felsen, Mauern, auf steinigem Boden, Bachgeschiebe und Sand verbreitet, auch an Bäumen und Dächern etc. im ganzen Gebiete: von den Niederungen bei Innsbruck bis in die Hochgebirge verbreitet, besonders bei Kalkunterlage, doch nicht überall fruchtend; speciell auf Glimmerschiefer der Hochalpen des oberen Sillgebietes auffallend durch große sterile Polster (F. Saut. 1 p. 189, Kern. Hb.); mit Blättern mit einem sehr kurzen und feinen Haare: IBtal am Haller Salzberg; mit asymmetrisch abgerundeten Blattspitzen: Navistal (Stolz b. Mat. 6 p. 82).

U Sonnwendjoch (Kern.); hie und da um Kufstein (Jur. 9 p. 15), Schwent, fruchtend (Nießl b. Mat. 3 p. 80); Zillertal: in der Zemm (Jur. 1. c.).

K Kitzbühel: an den Wurzeln der Bäume und an Felsen bei Mühlau (Ung. 8 p. 263).