

Col di Lana 1820—2080 m auf Eruptivbreccie, dabei die eingebackenen Kalkbrocken constant meidend, Ornella, auf Blöcken gegen den Padon kümmerlich (Mdo. 5 p. 584, 201).

D Innervillgraten: Alpe Schlöter 2600 m (Gand. b. Limpr. 7 I. p. 784), in Kalkstein und auf der Alpe Oberstoller (Gand.); auf Hornblendgneiß am Tauernübergang (Mdo. 7 p. 311), Matreier Tauernhaus (Funck, Laurer, Hornsch. b. Nees, Hornsch. & Sturm 1 II. 1 p. 141), Gschlöß, Möserlingwand (Ltz. & Mdo. 1 p. 63, 64, 65, 66), Möserlingwand 2200 m (Breidl. b. Limpr. 7 I. p. 784), im Matreier Tauerntale bis in die Waldregion 1600 m herab (Ltz. & Mdo. 1 p. 93; Breidl.), Froßnitz 14—1700 m (Breidl. b. Limpr. 7 I. p. 784 u. in litt.), Mullwitzaderl am Venediger 3000 m, Zunig 2600 m (Stolz b. Mat. 6 p. 89), Spitze des Großglockner 3798 m (Peyritsch b. Jur. 20 p. 172), Grauer Kees (Mdo. b. Ltz. & Mdo. 1 p. 93), Südostseite des Gornitscham 2730—2800 m, auf Blöcken am Peischlerpasse (Mdo. 7 p. 364, 347), Lessach 1300 m; Lienz: Schleinitz, Böses Weibele (Ltz. & Mdo. 1 p. 93), Thurneralpe (Gand.); Helm (F. Saut. Hb.).

N Pejo: an kieselhaltigen Felsen bis zum Sauerbrunnen herab (Vent. 7 p. 55; 22 p. 44); Rabbital: an kieselhaltigen Steinen auf Alptriften in Saënt (Vent. 2 p. 170; 7 p. 55), Cassetta di Saënt 1800 m (Stolz b. Mat. 6 p. 89).

B Latzfonsjerjoch (Sendtn. b. Rbh. 2 II. 3 p. 168); sparsam auf Melaphyr der Seiseralpe nach dem Pufatsch hin (Milde 29 p. 15), Schlern, auf Dolomit 2500 m (F. Saut. Hb.).

F Fassa: Südseite des Padon an Felsen (Mdo. 5 p. 549).

G Monte Nambino bei Campiglio, an einem trockenen Granitblocke 2400 m (Geheb).

31. (278.) *G. Limprichtii* Kern in Rev. bryol. XXIV. 1897 p. 56. — Limpr. III. p. 719 Nr. 948.

F Primör: Kalkfelsen an den Felsgallerieen, die vom Rollepasse nach dem Cimon della Pala hinaufziehen, bis 2100 m mit *Grimmia* anodon am 27. Juli 1876 von Rector F. Kern aus Breslau entdeckt (Kern. 1 p. 56; b. Limpr. 7 III. p. 719).

32. (279.) *G. mollis* Br. eur. — Limpr. I. p. 784 Nr. 333.

O Blankahorn im Stanzertale 2800 m, Krummgampental in Gepatsch 2400 m; Kühetai: Schwarzmoor (Stolz b. Mat. 6 p. 89), ober dem Finstertaler-See 2600 m (Arn. b. Jur. 20 p. 173); Oetzthal: Winnebachkar im Sulztale 2400 m (Stolz I. c.).

I Roßkogel: beim Abflusse des oberhalb der Inzinger Alpe gelegenen Sees 2270 m (Arn. 4 XVII. p. 555; b. Jur. 20 p. 173); Sellrain: Gleirschtal, Grieser Grieskogel 2700 m (Stolz b. Mat. 6 p. 89), Zischkeles 24—2900 m (Handel b. Mat. 4 p. 26; Stolz I. c.), Längental in Lisens, Muttererjoch im Votschertale (Stolz I. c.); Stubai: Oberiß an massen Felsen 1600 m (Kern. 86), Habicht 2840 m mit *Mielichhoferia nitida* und *Aretia glacialis* (Kern. Hb.), daselbst unter Schieferfelsen bei 23—3270 m (Handel b. Mat. 4 p. 26); Hochkar der Gwanalpe im Voldertal (Hfl. b. Jur. 20 p. 173); Tarntalerköpfe in den Schneewässern 2500 m (Kern. in Hb. Seitenstetten).

M Ochsenalpe in Langtaufers 26—2700 m (Breidl.); Stülfserjoch (Schimp. b. De Not. 5 p. 698); Sulden: am Madritschjoche in Quellwässerchen 2750 m: var. *aquatica* (Ltz. 3 p. 3; Ltz. & Mdo. 2 p. 454; Holl. in Hb. F. Saut.); hinterstes Martelltal gegen Pejo in