

Var.  $\beta$  *prolixum* Br. eur. — Limpr. I. p. 810.

**V** Gierenalpe im kleinen Walsertale bis 1950 m (Sendtn. b. Mdo. 6 p. 148).

**O** Jamtal in Paznaun, im Schlamme eines Baches; Oetztal: Maurach bei Umhausen (Stolz b. Mat. 6 p. 94).

**I** Sellrain: Längental in Lisens (Stolz b. Mat. 6 p. 94); Innsbruck: Lemmenhof am Paschberg (Pkt. u. Prantn. Hb. F.); Voldertal Murr b. Mat. 1 p. 234); Stubai: am Wasserfalle des Laugentalerbaches bei Ranalt; Navistal (Stolz b. Mat. 6 p. 94).

**P** Mühlbach in Taufers (Achtner, teste Mat.).

**D** Tauern: Wasserfall des Lobbenbaches (Stolz b. Mat. 6 p. 94).

**N** Rabbi: am Rabiesbache bei der Alpe le Capelle unter Gebüsch (Vent. 7 p. 55; 22 p. 45).

Var.  $\gamma$  *ericoides* (Web.) Br. eur., *Hypnum canescens*  $\gamma$  *ericoides* Web., *Trichostomum ericoides* Schrad. — Limpr. I. p. 810.

In der Berg- und Alpenregion des Schiefer- und Urgebirges allgemein verbreitet (Breidl.).

**V** Bregenz: auf Nagelfluhe am Gebhardsberge gegen Fluh, in typischen, großen Rasen (Blumr. b. Mat. 5 p. 98); Mittelberg: Maderthal bei Riezlern auf Schratenkalk 1360 m mit *Hylocomium Oakesii*, *Pseudoleskea atrovirens*, *Hypnum molluscum*, *Leptotrichum flexicaule* und *Barbula tortuosa*, „bezüglich des ungewöhnlichen Substrates gilt das [p. 69] bei *Dicranum longifolium* Bemerkte“ (Holl. 2 p. 75); Montavon: Tilisunaalpe 2100 m (Breidl.).

**O** Längental bei Kühetai 2000 m, Wasserform (Stolz b. Mat. 6 p. 95).

**I** Karwendeltal: im Grabenkar bei der Hochalpe auf Humus (Stolz b. Mat. 6 p. 95); Roßkogel: zwischen Schiefergestein südwestlich ober der Krimpenbachalpe 2000 m (Handel b. Mat. 4 p. 27); Sellrain: Kraspestal (Stolz b. Mat. 6 p. 94), Längental (Pkt. Hb. F. als *Rh. heterostichum*), Schönlisens, Votscher- und Senderstal; Innsbruck: Osterberg bei Götzens (Stolz l. c.), über dem Coreth-Hofe (Giovannelli Hb. F.), beim Lemmenhof (Pkt. u. Prantn. Hb. F.), Amraser Schloßpark, steril (Murr b. Mat. 1 p. 234); Gschnitztal: Kesselspitze, Trins (F. Saut. 1 p. 190, Hb.), Schieferberge südlich von Trins (Sarnth. Hb. F.), Alfachalpe 2000 (Baer b. Mat. 4 p. 27); Innervals (Stolz b. Mat. 6 p. 95); Brenner (F. Saut. l. c.).

**K** An Felsen und trockenem Heideboden (Ung. 8 p. 262).

**E** Brixen: zwischen Sarns und Albeins (Sarnth. Hb. F.).

**D** Oberhofer- und Staudertal in Innervillgraten (Gand.); Tauern: Mäserlingwand (Ltz. & Mdo. 1 p. 64), Schlattenkees (Stolz b. Mat. 6 p. 95), an Felsen im äußeren Defreggen vor Hopfgarten (Hornsch. 1 p. 341), Teichnitz in Kals (Gand.); um Lienz im Kiese der Gewässer, an Mauern verbreitet (F. Saut. Hb.).

**B** Bozen: Peter Ploner, Haselburg, an Felsen (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 13).

[**N** Pejo, auf Alpen (Vent. 7 p. 55, doch nicht 22).]

Var.  $\delta$  *epilosum* H. Müll., Milde, Br. sil. (1869), *R. canescens* var. *muticum* Vent. in *Nuovo Giorn. bot. ital.* II. (1870) p. 169