

Var. *viridis* Br. eur., *H. ciliata* ♂ *viridis* Br. eur., *H. albicans* ♂ *viridis* Limpr. — Limpr. I. p. 822.

**I** Innsbruck: Ahrntal (Pkt. Hb. F.); Trins; Brenner, an schattigen Stellen (F. Saut. 1 p. 190, Hb.).

**M** Meran: an schattigen Felsen (Milde 13 p. 449), Algund (Vent. 22 p. 46).

**D** Lienz: an Felsen im Walde unter Perlog (Gand.).

**B** Bozen: Haslacher Wald (Hsm. Hb.).

**T** Am Hügel von Tenna bei Pergine (Vent. 22 p. 46).

Var. *striata* (Wils.) Br. eur., *Anoetangium striatum* Wils. in Hook., Brit. Fl. II. Cryptog. (1833—1836) p. 12, *H. ciliata* ♀ *striata* Br. eur., III. Hedwigia p. 5.

**M** Stifserjoch (Röll 1 p. 662).

#### 64. *Braunia* Br. eur.

1. (294.) **B. alopecura** (Brid.) Limpr., *Leucodon alopecurus* Brid., *Braunia sciuroides* Br. eur. — Limpr. I. p. 824 Nr. 350.

**M** Meran: im Vellauer Tale bei Algund auf zahlreichen Felsen, oft große horizontale Flächen überziehend, meist mit *Campylopus polytrichoides*, *Hedwigia*, *Sempervivum arachnoideum* neben *Leptodon*, *Pterogonium*, *Dicranum Mühlenbeckii*; am 24. December 1861 fand ich einige noch unreife Früchte (Milde 13 p. 449), ist im Vellauer Tale sehr verbreitet, ihre zahlreich beobachteten unreifen Kapseln gelangten aber nur zum geringsten Teile zu vollkommener Reife, wahrscheinlich in Folge der noch im März und April eintretenden starken Nachfröste (Milde 30 p. 7), sonnige Felsplatten bei Algund, sehr häufig, meist mit *Campylopus polytrichoides*, *Grimmia Hartmanii*, *G. elatior*, *Hedwigia* (Milde b. Rbh. 8 Nr. 509), hierher auch die Angabe von *Hedwigidium imberbe*: Milde 7 p. 28 (siehe Milde 8 p. 93), an Felsen bei Algund, steril (Vent. 22 p. 46; Stolz b. Mat. 6 p. 96), im Grabbachtale bei Algund 750 m, steril (Kolb b. Mat. 1 p. 235).

### 19. Fam. Orthotrichaceae.

#### 65. *Amphidium* Nees.

1. (295.) **A. lapponicum** (Hedw.) Schimp., *Gymnostomum lapponicum* Hedw., *Hedwigia lapponica* Brid., *Anictangium lapponicum* Hedw., *Zygodon lapponicus* Br. eur., *Amphidium lapponicum* Schimp., *Gymnostomum striatum* Röhl. — Limpr. II. p. 5 Nr. 351, III. p. 720.

**V** Montavon: Gampadelstal 1900 m (Breidl.).

**I** Sellrain: auf Schieferfelsen unter dem Grat des Sunntiger am Seejöchl 2300 m, fruchtend (Handel b. Mat. 4 p. 27); Stubai: Kirchscharte mit *Stylostegium*, *Blindia* an nordwestlich exponierten Schieferfelsen 2480 m (Kern. Hb.); Tulfen am Glungezer 2000 m, fruchtend (Stolz b. Mat. 6 p. 96); unter dem Mölsersee im Wattenale 2200 m (Handel in litt.); nasse Schieferfelsen am Duxerjoch 22—2430 m, fruchtend (F. Saut. 1 p. 190, Hb.).