

M Meran: an Wassermauern (Milde 13 p. 434), Mauern bei Marling, Lana, im Naiftale (Bamb.).

E Brennerhöhe (Wagner b. Mat. 4 p. 28), Wolfendorn 2500 m (F. Saut. Hb.); Sterzing (Sendtn.); Brixen: Ratzötz unter Gebüsch (Sarnth. Hb. F.).

P Bei Obervintl und St. Lorenzen an Feldmauern (Simmer); Ampezzo: in den felsigen Wäldern von der Federa gegen die Giau-Alpe bis 1620 m (Mdo. 3 p. 595); Buchenstein: westlich von der Mühle bei Pieve auf Gutensteiner? Kalken und grünen Mergelschiefern ca. 1430 m, zwischen Pieve und Andraz ca. 1540 m (Mdo. 5 p. 99, 100).

D Gemein auf erdigen Mauern (Gand.); Tauern: verbreitet bis in die alpine Region (Ltz. & Mdo. 1 p. 96); Lienz: an Mauern, Baumwurzeln, verbreitet (F. Saut. Hb.).

N Rabbi: „alla cascata“ (Vent. 2 p. 164; 22 p. 57).

B Gröden: bei Pontifes (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 13); an Felsen um Ratzes und der Seiseralpe nicht gemein (Milde 29 p. 16), Schlern (Milde 29 p. 12); häufig um Bozen (Sendtn.; Hsm. Hb.; b. Bertol. 3 l. p. 237; Leybold in Hb. Hsm.; F. Saut. Hb.; Scherer b. Mat. 5 p. 99; Pfaff); Ueberetsch: Eislöcher, Gant auf Heideboden (Hfl.), Kallern (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 13); Montan bei Neumarkt (Krav. 1 p. 18; F. Saut. Hb.).

F Fassa: auf Dolomitenfelsen am Ausgange des Val Contrin (Vent. 22 p. 57).

T Trient: an Mauern gegen Martignano; Pergine, an Mauern gegen die Alpe Montagna Grande (Vent. 22 p. 57).

R Arco: bei Bolognano (Diettr. b. Warnst. 9 p. 13); Monte Baldo: in Bergwäldern am Allissimo (Vent. 7 p. 54; 22 p. 57); Vallarsa (Porta b. Hfl. 51).

Var. β *obtusifolia* (Funck). *E. obtusifolia* Funck b. Brid., Br. univ. I. (1826) p. 766, *E. vulgaris* β *obtusifolia* Br. germ. II. 1 (1827) p. 35. — Limpr. II. p. 109.

I Innsbruck: Frauhitt (Pichler Hb. F.), längs des Weges von der Weiherburg nach Mühlau auf Sand unter überhängenden Rasen (Kern. Hb.).

? **M** Langtauferejöchel 10000' [3160 m] (Simony 1 p. 319 als *E. obtusa* Schwägr.), geht aber nach Limpr. II. p. 110 nicht über 1900 m.

B „In Tyrolis montibus Schlernegebirg dictis prope Botzen caespitose habitat“ (Funck b. Brid. 2 I. [1826] p. 766); Bozen: Hohle Gasse in Gries, Wassermauer (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 13), Eisakmauer im Bozner Boden (F. Saut. Hb.).

Var. γ *apiculata* Br.; germ. — Limpr. II. p. 109.

U Hochiß am Sonnwendjoch (Pichler Hb. F.).

Var. *pilifera* Kern. in Herb. — vielleicht *E. vulgaris* var. *pilifera* Milde, Bryol. siles. (1869) p. 182, non *E. pilifera* Funck nec *E. vulgaris* γ *pilifera* Schimp., Syn. ed. 1 (1860) p. 286. Haare der Blätter sehr lang (oft von Blattlänge und darüber), äußerst spärlich gezähnt, farblos, nur an der Basis etwas bräunlich.

I Innsbruck: Kranebitter Klamm ober der Hundskirche mit *Barbula flavipes* auf einem mit Kalkgras beschüttetem, vermoertem Baumstrunke (Kern. Hb., rev. Mat.).