

N Rabbital: Saënt an der Schneegrenze (Vent. 2 p. 166), Hochfläche von Campisol (Vent. 22 p. 59).

B In kleinen Räschen auf Humus am Schlernplateau, nicht sehr häufig, mit *Plagiothecium pulchellum* und *Meesea uliginosa* (Milde 29 p. 12, 16; Stolz b. Mat. 6 p. 104), Molignon (Stolz l. c.).

F Fassa: auf Kalkgestein an schwer zugänglichen Riffen der Cima Pasni wie des Pordoi ca. 2270—2370 m, Südabhang des Padon an Felsen ca. 2560—2670 m (Mdo. 5 p. 562, 549), Valle Contrin am Colle Umberto, Marmolata, am Gletscher (Vent. 22 p. 59).

T Am Gipfel der Paganella (Vent. 22 p. 59; b. Limpr. 7 II. p. 143).

Var. *repandus*, caule longiusculo subdiviso, foliis ovatis acutis apice repando-serrulatis.

Tirol, an feuchten Felsenwänden (Hüb. 1 p. 86).

3. (352.) **D. splachnoides** (Thunb.) Grev. et Arnott, *Weissia splachnoides* Thunb., *Eremodon splachnoides* Brid., non *Tayloria splachnoides* (Schleich.) Hook., nec *Systylium splachnoides* Hornsch. — Limpr. II. p. 144 Nr. 420.

I Roßkogel: an den Quellen des Krimpenbaches 19—2200 m mit *Dicranum neglectum* und *Bryum pseudotriquetrum* (Kern. 37 p. 198, Hb.); Sellrain: am Bächlein ober Praxmar gegen die Zischkelesspitze auf Schiefer 2050 m, in einer nassen Senkung nordöstlich am Haidl bei Axams, häufig und in großen prachtvollen Rasen 2100 m, an ebensolchen Stellen am Aufstiege zum Seejoch bei Kematen 2200 m (Handel b. Mat. 4 p. 30); Patscherkofel 17—1800 m, Tulfen 1800 m (Stolz b. Mat. 6 p. 104); unter dem Mölsersee im Wattentale (Handel in litt.).

M Hinteres Martelltal gegen Pejo, in der Umgebung der Hütte (Ltz. 3 p. 4; Ltz., Holl. b. Mdo. 8 p. 159).

P Buchenstein: Quellmoor an der Nordostseite des Col di Lana ca. 2150 m ziemlich häufig an wasserreichen Stellen bis 3 Zoll hoch in einer Form, die an die Var. *luxurians* oder *flagellaris* der *Tayloria serrata* erinnert (Mdo. 5 p. 78; 4 Nr. 47). „ad collem di Lana et ad scaturigines loco dicto Sudell Omblie in valle Livinallongo“ (Mdo. b. De Not. 5 p. 470).

D An nassen Orten im Villgratentale (Gand.), Innervillgraten: auf den Böden im Ainettale 2200 m und auf der Alpe Kamelisen (Gand. b. Limpr. 7 II. p. 145); Tauern: Ochsenalpe in Prägraten (Hornsch. 1 p. 336, 435), Bergerpaß 2560 m, steril (Mdo. 7 p. 367), im obersten Leitertale bis 2440 m (Mdo. 8 p. 159); südlich der Drau: in Quellsümpfen des Helm (Gand.).

N Rabbital: häufig an Quellsümpfen auf Alpentriften in Saënt (Vent. 2 p. 166; 7 p. 59), daselbst auf Campisol im Rinnsale der Gletscherbächlein (Vent. 22 p. 29).

B Weißhorn, an Sumpfstellen mit *Philonotis* (Vent. 22 p. 59).

G Adamello: Monte Pisgana (Rota b. De Not. 5 p. 471).

74. *Tayloria* Hook.

1. (353.) **T. serrata** (Hedw.) Br. eur., *Splachnum serratum* Hedw. — Limpr. II. p. 147 Nr. 421.

V Mittagspitze und Widderstein 1790 m (Jack b. Limpr. 7 II. p. 149);