

vor dem Kniebiß bei Praxmar 1500 m einen großen Stein überziehend (Handel in litt.).

M Im Walde bei Trafoi (Schimp. 4 ed. 2 p. 360).

P Taufers: im Reintal bei St. Wolfgang (Berroyer b. Jur. 20 p. 229); „Nelle alpi di Ampezzo“ (Mdo. b. Sacc. & Bizz. 1 p. 1362).

D In Nadelwäldern auf faulem Holze, alpinen Bachufern (Gand.); bei Innervillgraten und in schattigen Nadelwäldern unter der Gisseralpe (Gand. b. Limpr. 7 II. p. 151); Hofalpe bei Lienz (Gand. b. Jur. 20 p. 229).

3. (355.) **T. acuminata** Hornsch. (1826), *Hookeria acuminata* Schleich. b. K. Müll. (1848). — Limpr. II. p. 151 Nr. 423.

O Oetzal: auf einer berasteten Brunnenmauer in Vent (Röll 1 p. 662).

E Gossensaß: Daxalpe. Valmingtal (Trautm. 1 p. 139).

D Arental bei Innervillgraten in der Felshöhle „Ofenloch“ der Oberstoller-Alpe 2000 m, eine üppige sterile Form auf einer grasigen Mauer im Oberhofer Tale 1560 m (Gand. Mscr. u. b. Limpr. 7 II. p. 152).

Var. ♂ **obtusa** Br. eur. (1844), *Raineria splachnoides* De Not. (1838), *Tayloria Raineriana* De Not. (1869), *T. acuminata* var. *Raineri* Vent. (1884). — Limpr. II. p. 152.

D Auf einem Ameisenhaufen im Walde bei Innervillgraten (Gand. b. Limpr. 7 II. p. 152), auf faulem Holze und Waldböden unter der Starze in Innervillgraten 1400 m (Gand.).

4. (356.) **T. splachnoides** (Schleich.) Hook., *Hookeria splachnoides* Schleich. — Limpr. II. p. 153 Nr. 424.

Südtirol (Lehmann b. Hedw. 1 Suppl. I. 2 [1816] p. 340; b. Brid. 2 I. p. 266; b. Host 3 II. p. 707; b. Jur. 20 p. 230).

I Krimpenbachalpe am Roßkogel auf altem Dünger (Kern. Hb.); Sellrain: im Gleirschtale bei St. Sigmund auf Höckern in sumpfiger Gegend (Pkt. b. DT. 10 p. 231, Hb. F.), Senderstal 1500 m, auf einem Schieferfelsen unter *Alnus viridis* gegenüber dem Adelhofe bei Axams gegen das „Kögele“ 1400 m (Handel b. Mat. 4 p. 30); Brenner: an quelligen Orten des Griesbergtales ca. 1420 m (F. Saut. 1 p. 191).

K Am Kleinen Rettenstein 1950—2270 m (Saut. b. Hb. 51).

M Martelltal (Fleischer [1825] b. Hochstetter 2 p. 274).

D Innervillgraten: im Taffinetal auf faulender Streu und im Käsertal (Gand. Mscr. u. b. Limpr. 7 II. p. 154); Iseltal: in Moospolstern unter Felstrümmern bei St. Johann im Walde (F. Saut. Hb.); auf faulen Baumstümpfen unter der Thurneralpe bei Lienz 1600 m (Gand. l. c.).

B Ochsenwald auf der Seiseralpe (K. Müll. 3 p. 301); Ueberetsch Eislöcher (Saut. 14 p. 270; Sendtn. b. Hb. 12 p. 178; b. DT. 10 p. 231, Hb. F.), am Berge oberhalb Eppan in prachtvollen Exemplaren (Sardagna b. Vent. 22 p. 59).

G Val Daone hinter Boazzo, selten (Ltz. 3 p. 61; Ltz. & Mdo. 2 p. 454).

5. (357.) **T. Rudolphiana** (Hornsch.) Br. eur., *Eremodon Rudolphianus* Hornsch. — Limpr. II. p. 154 Nr. 425.