

steinigen Gerölle mit *Marchantia*, *Preissia* und Laubmoosen (Arn. 4 XVII. p. 563); Steinacherberg 1600 m, Pentelstein 1900 m, Vinaders 1200 m, Obernberger-Seen 1450 m auf Kalk- und Schieferfelsen (F. Saut. 1 p. 197, Hb.), Padaun, Vennatal (Stolz b. Mat. 6 p. 106).

U Zillertal: Märzengrund 1100 m (Herzog).

K Auf der Hohen Salve (Ung. 8 p. 263); Kitzbühel: Alpe Blaufeld auf Kalkfelsen (Saut. 7 p. 462, 477); zwischen Paß Thurn und Kirchamwald (Arn. b. Jur. 20 p. 298).

M Am Rieglerbache in Langlaufers 2000 m (Breidl.); Stilsferjoch (Schimp. b. Jur. 20 p. 298); Sulden (Quelle in litt. ad Mat.).

E Brenner, an Wasserfällen (Ltz. & Mdo. 1 p. 99), Brennerb. (F. Saut. Hb.); Pfäferschäl (Trautm. 1 p. 139).

P Taufers: im Bereiche des Reintalfalles, einzeln (Ltz. 2 p. 1329); Pragser-See, auf mooriger Walderde an schattigen, feuchten Stellen 1500 m (Diettr. b. Warnst. 9 p. 14); Ampezzo: Sasso di Formin an großen Blöcken in Spalten 2050–2110 m, Faloria, dritte Stufe ca. 1950 m (Mdo. 3 p. 598, 435); Buchenstein: über dem Passe im obersten Cassianer- oder Chiumenatal gleich unter dem groben Schutt — 2180 m — unter vorspringenden Felsen (Mdo. 5 p. 76).

D In Felsschluchten bei Innichen und in Innervillgraten (Gand. Mscr. u. b. Limpr. 7 II. p. 228); im Lueg bei Sillian (Gand.); Tauern: Gschlöß (Arn. b. Jur. 20 p. 298; Stolz b. Mat. 6 p. 106), Möserlingwand (Hornsch. 1 p. 329; siehe dagegen Ltz. & Mdo. 1 p. 68), Tauernatal (Berroyer b. Jur. 20 p. 298), unter der Ochsenalpe in Prägraten (Hornsch. 1 p. 336), Böbelalpe in Prägraten 1500 m (Breidl.), Virgen an Wasserfällen (Ltz. & Mdo. 1 p. 99), Steinerjoch (Zwanziger b. Jur. 20 p. 298), Klauswald 940 m (Breidl. *ibid.*), Steinalpe, Prosegglamm (Stolz b. Mat. 6 p. 106), St. Johann im Walde (F. Saut. Hb.); Lienz: Neualpe 2430 m (Gand. b. Jur. 20 p. 298), Felsen an der StraÙe gegen Ainet 700 m (Breidl.), an nassen Felsen in der Pflster (F. Saut. Hb.).

N Rabbital: sehr schön an den Mauern (in Felsspalten) beim Wasserfalle des Baches, welcher von der Alpe Capelle in den Rabiesbach fließt (Vent. 2 p. 166; 7 p. 58; 22 p. 63; b. De Not. 5 p. 432; b. Jur. 20 p. 298).

B Durnholzerspitze, oberhalb Latzfons gegen Heilig-Kreuz an den Rändern eines Quellbaches (Sendtn. b. Hfl. 51).

F Fassa: rechte Talseite bei Canazei auf Moder verschiedener Gesteinslagen ca. 1850 m (Mdo. 5 p. 562), auf Melaphyr bei Alba (Vent. 22 p. 63).

T Auf Schiefer längs eines Baches, welcher den auf die Alpe Montagna Grande bei Pergine führenden Weg kreuzt (Vent. 22 p. 63).

2. (378.) **P. demissum** (Hoppe et Hornsch.) Lindb., *Meesia demissa* Hoppe et Hornsch., *Bryum demissum* Hook., *Pohlia demissa* Hüb., *Zieria demissa* Schimp. — Limpr. II. p. 228 Nr. 455.

O Schartlkopf bei Nauders 2808 m (Breidl.).

I Am Gipfel des Rofkogel 26—2640 m (Kern. Hb.; Stolz b. Mat. 6 p. 107); Sellrain: Freihut 2616 m und Grieser Grieskogel 2700 m (Stolz l. c.); Brenner: am Südabhange des Griesbergtales 2530 m auf Gneiß (Arn. 4 XVII. p. 566).

U Gipfelplatte des vorderen Sonnwendjoches 2220 m auf torfähnlicher, feuchter Erde, Kalk (Arn. 4 XII. p. 531; b. Rbh. 8 Nr. 1214); Ziller-