

- P** Auf Schotterboden zwischen Toblach und Innichen (Gand.).
- D** In den Tauern bis über 2270 m (Mdo. 8 p. 173), Umballtal 2100 m, Schlatenkees 1700 m, Dorferalpe in Prägeraten 2000 m, Sandbänke am Tauernbache bei Matrei 950 m (Breidl.), Teischnitz in Kals; Lienz: Debanttal, Neualpe, Tristacher Bergwiesen (Gand.).
- N** Rabital (Vent. b. De Not. 4 p. 110); Monte dei Laghetti (Vent. b. De Not. 5 p. 387), Alpentriften in Saënt (Vent. 2 p. 165), Hochtal von Sdernai (Vent. 22 p. 68).
- B** Auf Humus an Felsen um Ratzes und am Schlern, nicht häufig, am Grünerdebruche bei der Proßliner Schwaig (Milde 29 p. 16, 11).
- F** Fassa: in Wäldern bei Penia (Vent. 22 p. 68).
- T** Valsugana: an einer Sumpfstelle neben dem Wege von Vignola nach Vetriolo (Vent. 22 p. 68).
- R** Monte Baldo: zwischen Legföhren am Artilone-Gipfel (Vent. 22 p. 68).

(Der Originalstandort: Paß Lueg liegt nicht in Tirol, wie noch bei Limpricht 7 II. p. 353 angegeben, sondern bekanntlich im Herzogtume Salzburg.).

14. (409.) **B. Garovaglii** De Not. — Limpr. II. p. 361 Nr. 507.

**M** Stilsferjoch: „Stelvio“ resp. „in monte Stelvio“ [ungewiß ob innerhalb der Grenze] (Garovaglio b. De Not. 4 p. 111, 112; 5 p. 401).

15. (410.) **B. palleseens** Schleich. — Limpr. II. p. 368 Nr. 510.

- V** Montavon: Geweilkopf 23—2400 m (Breidl.).
- O** Schartlkopf bei Nauders 2808 m (Breidl.); Oetzal: Vent (Wagner).
- I** Isäl am Haller Salzberg (Stolz b. Mat. 6 p. 113); Sellrain: Lisens gegen die Burwand auf Erde (Pkt. b. DT. 10 p. 244, Hb. F.; b. Pkt. 8 p. 51 steht irrtümlich *B. pallens*); Innsbruck: unter der Lizum (Stolz b. Mat. 6 p. 113), Völs, auf Schiefer im Axamer Bache 750 m, auf Sand am Bache in der Götzenser Klamm 1000 m (Handel b. Mat. 4 p. 34), Siltschlucht, Paschberg (Hll.), unter Heiligwasser am Wege, Patscherkofel, auf Felsen an den mit Detritus gefüllten Nischen am Kreuzbrunnen 1900 m, auf humusbedeckten Felsen 1960 m; Stubai: Erdabrisse zwischen Oberiß und Alpein mit Webera nutans (Kern. Hb.), Waldrast (Baer b. Mat. 4 p. 34); Gschnitztal: Blaser 2000 m mit abnormen Büchsen (Baer b. Mat. 2 p. 193), Padasterjoch (Degen b. Mat. 4 p. 34), Kirhdachscharte, an schattigen Felsterrassen zwischen *Barbula ruralis* und *Didymodon rubellus* 2480 m (Kern. Hb.); Steinach, an sumpfigen Waldstellen; Duxerjoch 2200 m (F. Saut. 1 p. 192, Hb.); Vinaders bei Gries (Sarnth. b. Mat. 5 p. 101).
- U** Zillertal: zwischen Vorderdux und Freithof (Sabransky, teste Mat.).
- K** Kitzbühel: auf der Hohen Salve, am Geschöß (Ung. 8 p. 264); Paß Thurn auf berieselten Schieferwänden (Reyer); Geisstein 23—2360 m (Breidl.).
- M** Nockspitze in Langtaufers 3010 m (Breidl.); auf modernden Baumstrüngen am Bache unter der Praderalpe, Schiefer (Kern. Hb.), Stilsferjochstraße (K. Müll. 3 p. 395), Ferdinandshöhe (Kern. Hb.), an Stützmauern längs der Straße 2700 m, Dreiländerspitze 2800 m (Breidl.); Trafoi: var. *microcarpon* (Schimp. Hb. F.).
- E** Brenner (Sendtn.), Gidergitz auf feuchtem Sand 2200 m (F. Saut. Hb.); Ried bei Sterzing (Baer b. Mat. 4 p. 34).