

Steinach (F. Saut. 1 p. 198), Steinach, Steinacherberg, Griesberg am Brenner, quellige Orte 1900 m (F. Saut. Hb.).

K Kitzbühel: zahlreich auf dem Torfmoore des Schwarzsees (Ung. 8 p. 265).

D Lienz: sumpfige Stellen in der Pfister (F. Saut. Hb.).

B Am Schlern (Milde b. Limpr. 7 II. p. 513), am Fuße des Schlern bei Ratzes (Vent. 22 p. 76).

3. (462.) **M. triquetra** (L.) Aongstr., *Mnium triquetrum* L., *Bryum triquetrum* Hook. et Tayl., *Diplocomium tristichum* Funck p. p., *Meesea tristicha* Br. eur. — Limpr. II. p. 513 Nr. 581.

O Am Grünsee bei Nauders 1850 m (Breidl.).

I Roßkogel: an einer sumpfigen Stelle am Wege von Oberperfuß her bei 1800 m (Handel b. Mat. 4 p. 38); Innsbruck: Sagbach bei Mutters; Gschnitztal (Stolz b. Mat. 6 p. 122); Padasterjoch (Degen b. Mat. 2 p. 194), schwammige Sümpfe in Gschnitz (F. Saut. 1 p. 198).

U Achenal: Bruixer Moos (Pichler Hb. F.); Kufstein (Berroyer b. Limpr. 7 II. p. 517); in einem Torfmoore am Thierberg, steril (Jur. 9 p. 18); Zillertal: zwischen Vorderdux und Freithof, Brandberg (Sabransky, teste Mat.).

K Auf Sumpfwiesen am Walchsee (Hfl. b. Jur. 9 p. 18).

E Pfitsch: im Moore vor Kematen 1380 m (Handel b. Mat. 4 p. 38).

P St. Wolfgang im Reintale (Berroyer b. Jur. 20 p. 320); Antholz (Hsm.); Ampezzo: Sumpfstelle zwischen der Tofana und Crepa mit *Cinclidium* und *Hypnum trifarium* 1360—1500 m (Mdo. 3 p. 597; b. Ltz. & Mdo. 2 p. 455); Buchenstein: Quellsümpfe an der Ostseite des Pordoiaches 2110—2210 m (Mdo. 3 p. 195).

D Tauern: in einer kleinen Versumpfung kurz vor der Moräne in Gschloß auf dem vom Eiswasser erkälten Boden, 1754 bezw. 1690 m (Ltz. & Mdo. 1 p. 66, 100; Mdo. 8 p. 189; b. Jur. 20 p. 320), vor dem Klauswald bei Windischmatrei 900 m (Breidl. b. Jur. 20 p. 320).

B Ueberetsch: Montiklersee, steril (Hfl. b. Mat. 1 p. 240).

F Primör: Val Calda 1465 m (Degen b. Mat. 4 p. 38).

T Pinè: in den oberen Sümpfen unweit von Serraja und beim See von Nogarè, stets steril und spärlich (Vent. 21 p. 453; 22 p. 76; Vent. & Bott. 1 p. 38).

94. *Catoscopium* Brid.

1. (463.) **C. nigrum** (Hedw.) Brid., *Weissia nigrita* Hedw. — Limpr. II. p. 518 Nr. 582.

Tirol (Sprengel b. Poll. 3 III. p. 311).

O Paznaun: Fimbertal, an einer Quelle bei der Gampenalpe 1900 m (Stolz b. Mat. 6 p. 122).

I Haller Salzberg: in Erdhöhlungen im Ibtale vor der Halde des Stempeljoches mit *Meesea* 1700 m; Vomperloch: am Wegrande vor der Glanalpe 1180 m, steril; Sellrain: Aufstieg zum Seejöchl 2100 m (Handel in litt.); Innsbruck: am Gipfel des Herzenfleck in der Lizum 2340 m auf Schiefer und Kalk (Handel b. Mat. 4 p. 38), Lizum (Quelle), Götzenser Alpe (Handel in litt.); Waldrast: spärlich am Fuße der Serleswände bei 1720 m (Arn. 4 XI. p. 494), am Blaser auf trockenen Erdabsätzen (F. Saut. 1 p. 198, Hb.), Blaser, an feuchten, rasigen Stellen, Vorkommen ähnlich wie bei Oreas, 2150—2200 m (Kern. Hb.);