

Brixen: Walderhof (Sarnth. b. Mat. 5 p. 103), zwischen Sarns und Albeins (Sarnth. Hb. F.).

P Sambock, Hegedexspitze, Getzenberg bei Ehrenburg; St. Martin in Gsies; Geiselsberg, Olang (Simmer).

D Tauern: Dorferalpe in Prägraten (Stolz b. Mat. 6 p. 124); Vier-schach, Hochbörsing und Dorfberg bei Sillian (Simmer); Lienz, auf Schiefer und Gneiß (F. Saut. Hb.); am Schloßberg, Thurnerberg und nächst Tristach (Gand.).

N Rabbital: an Waldstellen, minder häufig (Vent. 2 p. 162).

B Säben bei Klausen (Sendtn. in Hb. bot. Mus. Wien); Sarntal: schön an den trockensten Porphyrfelsen (Ltz. & Mdo. 1 p. 100); Ritten (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 362), Rittnerhorn (Krav. 1 p. 17), Klobenstein (Hsm. b. Mat. 1 p. 240), Weidach (Hsm. Hb.); um Ratzes an Waldwegen, hie und da (Milde 29 p. 12, 16); Bozen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 362; Wagner); Runkelstein (Hsm. Hb.; Krav. 1 p. 17; Diettr. b. Warnst. 9 p. 16), Haslacherwald (Hsm. b. DT. 10 p. 245; Diettr. l. c.); Kampill; Ueberetsch; Sigmundskron (Pfaff), Eislöcher (Diettr. l. c.); Tschuipental bei Leifers (Hsm. Hb.).

T Trient: auf Eruptivgestein bei Villazzano; auf Schiefer bei der Alpe Montagna Grande di Pergine (Vent. 22 p. 77).

R Val di Ledro, gegen Tremalzo 1600 m (Porta b. Mat. 1 p. 240); Riva (Porta b. Mat. 3 p. 84); Monte Baldo und Tridentiner Berge (Poll. 3 III. p. 383).

„Insignem varietatem ex alpinis Tyrolis habeo, foliis multo brevioribus, cauliculis angustioribus et longioribus, inferne rubiginoso tomento obvolutis. Capsulae laterales, sed longe pedunculatae. Intermedia quasi species inter hanc et antecedentem [„B. lateralis“], (Hoffm. 1^a p. 55). Ist nach dieser Beschreibung eine große Form der *B. pomiformis* mit langen Seten (Mat. in litt.).

Var. β *crispa* (Swartz). *B. crispa* Swartz. *B. pomiformis* β *crispa* Br. eur., *Bryum montanum* Sm. — Limpr. II. p. 544.

V Feldkirch: Felsenau (Schönach; Mat. 1 p. 240).

I Sellrain: Senderstal (Stolz b. Mat. 6 p. 124); Innsbruck: in Felsritzen (Hfl.), Götznerbach (Stolz l. c.), Hufllhof (Benz b. Mat. 2 p. 194), Sillschlucht (Baer b. Mat. 1 p. 240; 2 p. 194), Paschberg, auf Schiefer mit der Art (Pkt. b. DT. 10 p. 245, Hb. F.; Murr b. Mat. 1 p. 240; Benz l. c.), unter dem Lemmenhof (Prantner Hb. F.; b. DT. l. c. als *B. pomiformis*), Amraser Schloßpark (Benz l. c.); Steinach, an Waldwegen (F. Saut. Hb.).

K Kitzbühel: gemein an Felsen der Gebirge, z. B. des Schattbergs (Ung. 8 p. 264); Fieberbrunn (Lechner, teste Mat.).

M Meran: moosreiche Alpenwälder in Sprons, im Ziebtale und anderen Orten (Bamb.), Marlinger Waal (Stolz b. Mat. 6 p. 124).

P Enneberg: Monte Sella im Rautale 1900 m (Simmer); Pragser-See (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 362).

D Lienz: Schloßberg mit der Art (F. Saut. Hb.).

B Eisaktal: Aufstiege vom Tinnebach nach Säben (Wagner); Ritten, Bozen, feuchte Stellen (Krav. 1 p. 17 als *B. montana*); an Felsen bei Balzes massenhaft (Milde 29 p. 7); Bozen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 362); Haslacherwald (Hsm. Hb. F.), von Virgl nach Vorderkollern (Sendtn.); Ueberetsch: Felsritzen in Eppan (Hfl.).