

Gipfel des Mittagkogel auf Erde 3150 m (Arn. 4 XVII. p. 537); Oetzal (Gemböck 5 p. 438); Windachtal (Zederbauer b. Mat. 3 p. 85).

I Roßkogel (Sendtn.), Oberperfuß, in den Narduswiesen; Sellrain: zwischen Sellrain und Gries, Gries und Praxmar (Kern. 86), Lisens (Pkt. Hb. F.); häufig auf Holzschlägen, trockenem Moorboden, Erdbrüchen etc. der rechten Seite des Inntales bei Innsbruck und Hall 600—1200 m (Hfl. 51; Prantner; Pichler Hb. F.; Kern. 86 u. Hb.; Sarnth. Hb. F.; Wagner; Murr b. Mat. 1 p. 242; Handel b. Mat. 4 p. 42; Stolz b. Mat. 6 p. 131; F. Saut. Hb.); eine zu *P. strictum* hinneigende Pflanze von hier, leg. Winkler, erwähnt Mat. 1 p. 241; Gschnitztal: Trins, in Föhrenwäldern auf Kalk- und Schieferboden (Kern. 86 u. in Hb. bot. Mus. Wien); Steinach, auf Heideboden (F. Saut. 1 p. 199, Hb.); Griesberg am Brenner (Stolz b. Mat. 6 p. 131).

U Achenal: in der Azaleenformation am Unnutz 1900 m auf tiefem Humus über Kalk (Kern. Hb.); Zillertal: Gerlos, auf Waldmoder, ca. 11—1200 m (Mdo. 3 p. 383), Grünberg, im Walde oberhalb Brunnhaus (Floerke 3 p. 145 als *P. juniperifolium*), in der Zemm (Jur. 9 p. 18), Gneißgerölle bei der Waxegg-Alpe (Arn. 4 XXIV. p. 256).

K Auf dünnen Heiden und Weideplätzen gemein (Ung. 8 p. 266); Eingang der Windau, auf zähem Tonboden (Mdo. 7 p. 196); Geisstein, eine niedrige Form (Saut. in Hb. F. Saut.).

M Meran, häufig (Bamb.).

E Zirogalpe am Brenner (Pfaff b. Mat. 3 p. 85).

P Ahrntal (Huter in Hb. Hsm.); Antholz (Hsm. Hb.); Buchenstein: Pordoihoch oberhalb Arabba 1140—1790 m im Trümmerwerk der eruptiven Breccien auf trockenen, sandigen Stellen, Ornellatal, auf größeren, um die untere Alpe freiliegenden Eruptivblöcken mit Kalkeinschlüssen 1950 m, Trümmerfelder am Padon 2240—2400 m, Breccie, Augitporphyr, am südlichen Hügelrücken auf sandigem Humus 2270 m (Mdo. 5 p. 195, 200, 201).

D Gemein (Gand.); Innervillgraten (Gand. b. Kern. 78^a Nr. 2716, 78^b VII. p. 86); Tauern: häufig, jedoch mehr auf der Nordseite des Hauptkammes (Ltz. & Mdo. 1 p. 101), ober dem Tauernhause (Hornsch. 1 p. 328), Dorferalpe am Venediger 2200 m (Breidl.), am Peischlachthörl bis 2660 m (Mdo. 8 p. 201); Innichen (Stolz); Lienz: auf mageren Triften (Gand.), auf dünnen Plätzen, Heiden verbreitet (F. Saut. Hb.).

N Rabbital: in Wäldern überall und sehr schön „alla cascata“ (Vent. 2 p. 164).

B Ritten und Rittnerhorn (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 386), Fennwand bei Lengmoos (Hsm. Hb.), Klobenstein (Krav. 1 p. 21); auf Felsen um Ratzes häufig (Milde 29 p. 17); Bozen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 386, Hb.); Kühbacherwald (Hsm. Hb.).

F Fassaner Alpen (Sendtn.): auf dem Joche zwischen Val Contrin und Val di Pozza von 2200 m an (Mdo. 5 p. 564); Primör: unterhalb San Martino 1400 m (Degen b. Mat. 4 p. 42).

G Madonna di Campiglio (Perini b. Hfl. 51).

T Trient, Cognola (Perini b. Hfl. 51).

R Folgaria (Tecilla b. Hfl. 51); Roveredo (Crist. b. DT. 10 p. 217, Hb. F.); Vallarsa (Porta b. Mat. 1 p. 242); Monte Baldo, ai Lavaei, al Pian della cenere (Poll. 1 p. 113).