

**D** An Kalkfelsen in tiefschattigen Spalten bei Windischmatrei 1040—1270 m mit der Species (Ltz. & Mdo. 1 p. 103), auf Kalkglimmerschiefer über der Prosegger Klamm (Mdo. 8 p. 133), um Windischmatrei in allen Uebergängen zur Normalform (Mdo. 8 p. 215), daselbst bei 1070—1360 m an sehr schattigen Kalkwänden, seltener in größeren Felsritzen mit *Neckera complanata*, *Zygodon gracilis* etc. (Mdo. b. Rbh. 8 Nr. 610).

**B** Bozen: Kühbacherwald, auf Dolomittfelsen [?] mit der Art (Hsm. b. Mat. 1 p. 243).

**G** In allen Uebergängen auch im Val Daone (Holl. b. Mdo. 8 p. 277).

#### 113. *Homalia* Brid.

1. (521.) *H. trichomanoides* (Schreb.) Br. eur., *Hypnum trichomanoides* Schreb., *Leskia trichomanoides* Hedw., *Omalia trichomanoides* Br. eur. — Limpr. II. p. 715 Nr. 657.

**V** Steinbruch bei Bregenz (Blumr. b. Mat. 1 p. 243).

**I** Innsbruck, sehr häufig an der Südseite des Inntales, vorzüglich an Erlen, dann am Grunde von Haselsträuchern, an feuchten Schieferfelsen, auch an Erdabrissen 570—900 m: Gallwiese, Hußhof, Berg Isel, Sonnenburg, Paschberg, Iglerswald, Amras, Innau bei Egerdach, Aldrans (Pkt. b. DT. 10 p. 249, Hb. F.; Kern. Hb.; Wagner; Murr, Benz, Baer, Handel, Stolz b. Mat. 1 p. 243; 3 p. 85; 4 p. 43; 5 p. 104; 6 p. 136).

**U** Zillertal: bei Mayerhofen (Jur. 9 p. 18), Stillupplamm 10—1100 m, hier noch fruchtend (Sabransky, teste Mat.).

**K** Kitzbühel: an Baumstämmen und Felsenspalten bei Stegen mit *Neckera complanata* (Ung. 8 p. 269).

**M** Meran: „gemein“ (Bamb.), wurde daselbst aber von Milde vergeblich gesucht (Milde 13 p. 451), Spronsertal, Fineleloch (Stolz b. Mat. 6 p. 136).

**D** Iseltal: bei Peischlach (Ltz. & Mdo. 1 p. 103); Lienz: in der Pfister (Gand.).

**B** Bozen: Runkelstein (F. Saut. Hb.).

### 36. Fam. *Fabroniaceae*.

#### 114. *Fabbronia*\*) Raddi.

1. (522.) *F. pusilla* Raddi. — Limpr. II. p. 727 Nr. 660.

[**M** Meran (Bamb. 4 p. 664; b. Saut. 29 p. 63, 64; b. K. Müll. 3 p. 361; b. Schimp. 4 ed. 1 p. 503); sparsam unter Durrenstein auf *Quercus lanuginosa* (Milde 30 p. 8); die vorliegenden Exemplare des Hb. F. von Bamberger am Marlingerberg und von Milde gesammelt erwiesen sich aber insgesamt als *F. octoblepharis*.]

**B** Bozen (Saut. 29 p. 64; Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 430); Kalvarienberg, an überhängenden Porphyrfelsen, sehr selten fruchtend (F. Saut. b. Kern. 78<sup>a</sup> Nr. 303, 78<sup>b</sup> I. p. 114), an alten Stämmen (Krav. 1 p. 18);

\*) Name nach Antonio Fabbroni, Münzdirector in Florenz, weshalb die übliche Schreibart *Fabronia* hier abgeändert wurde.