

Auer: an Eichen bei Castell Feder, in Menge (Vent. 22 p. 86), daselbst an Eichenrinde, Uebergänge zu *F. octoblepharis* (Vent. 17 p. 54; 22 p. 86).

Trient: auf einer Cypresse bei der Villa Rossi in Villazzano (Vent. 7 p. 59; 22 p. 86).

R häufig an Oelbäumen bei Arco und Riva (Vent. 22 p. 86); Riva, prachtvoll an einem Oelbaume (Ltz. & Mdo. 1 p. 104; b. Jur. 20 p. 374), ebenso (Warnst. 9 p. 17).

2. (523.) *F. octoblepharis* (Schleich.) Schwägr., *Pterogonium octoblephare* Schleich. — Limpr. II. p. 728 Nr. 661.

M Meran (Bamb. 4 p. 664; b. Saut. 29 p. 63; b. Bruch, Schimp. & Gumb. 1 V. Fabronia Suppl. 1 etc.): Riffian, Schönna (Bamb. Hb. F.), Kachelberg (K. Müll. 3 p. 361), in unendlicher Menge an zahllosen Standorten über das ganze Tal verbreitet, teils auf Humus in den Ritzen der Dorfmauern, teils an beschatteten Felsen mit *Barbula alpina* var. *inermis*, *Leucodon*, *Hedwigia* etc.; am 10. November bereits vollkommen ausgewachsene aber noch grüne Kapseln; im Ganzen sind Früchte nicht sehr häufig. Alte Früchte noch im November hie und da, am häufigsten an Dorfmauern in Algund; auch auf *Quercus lanuginosa* sehr häufig, selbst auf bloßer Erde bisweilen, nicht selten auch auf alten Schindeldächern (Milde 13 p. 452; 30 p. 8 etc.; b. Rbh. 8 Nr. 468; Scriba b. F. Schultz 3 B. IV. Nr. 387), häufig um Meran auf Felsen zwischen Gratsch und Algund, gemein im Vellauer Tal, Plarser Waal, Durrenstein, Weinbergsmauern und Schindeldächer bei Algund (Bamb.; Milde b. Limpr. 7 II. p. 730).

D An warmen Felsen um Innichen, Sillian, Lienz, nicht gar selten fruchtend (Gand.), zwischen Sillian und Schlittenhaus (Gand. b. Limpr. 7 II. p. 730); bei Windischmatrei in warmen, aber schattigen Aushöhlungen des Kalkglimmerschiefers 870—910 m, sparsam mit Deckeln Mitte Oktober 1862 (Ltz. & Mdo. 1 p. 104), am Peischlacher Berg 900 m (Mdo. b. Jur. 20 p. 373); Lienz: auf Schieferfelsen des Thurnerberges, ca. 1070 m, an sonnigen Felsen der Taxerhöhe des Schloßberges und in Felsspalten des Aineterbergs (Gand. b. Jur. 20 p. 373; F. Saut. Hb.).

B Velthurns bei Klausen, in Spalten sonniger Schieferfelsen (F. Saut. Hb.); an Felsen unter der Ruine Greifenstein (Leybold b. Jur. 20 p. 373, Hb. F.; Milde 22 p. 52); im Sarntale (Milde 22 p. 53), daselbst bei Halbweg (F. Saut. Hb.); an Porphyrfelsen bei Bozen, spärlich fruchtend 260 m (F. Saut. b. Kern. 78^a Nr. 717, 78^b II. p. 152), Ceslar, Schloß Ried, Runkelstein (F. Saut. Hb.), an einer alten Linde am Loretoplatze (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 17), Kalvarienberg (Milde 22 p. 53), am nördlichen Abhange des Virglerberges (Hsm. b. Jur. 20 p. 373), Felsen zwischen Haselburg und Stallerhof (Zickendr. 1. c.), Felsenhalden oberhalb des Stallerhofes (Hözl b. Warnst. 9 p. 17), Seitwand (Pfaff); Kaltern, gegen Gmund an Felsen und Bäumen, in Menge (Vent. 22 p. 86); Auer: auf Porphyry bei Castell Feder mit Uebergängen zu *F. pusilla*, und zwar an Stellen, wo Eichenstämme einen Felsen berühren (Vent. 7 p. 59; 17 p. 53; 22 p. 86; F. Saut. Hb.).

? **G** Vor Daone (Ltz. 3 p. 60, nur als „Fabronia“ angegeben).

115. *Anacamptodon* Brid.

1. (524.) *A. splachnoides* (Fröhl.) Brid., *Orthotrichum splachnoides* Fröhl. — Limpr. II. p. 732 Nr. 663.