

R Monte Baldo: an Buchenrinde unter dem Corno della Paura (Vent. 22 p. 89).

2. (539.) **L. saxicola** (Br. eur.), *L. striata* ♂ *saxicola* Br. eur., *L. saxicola* Mdo. — Limpr. II. p. 792 Nr. 683.

V Montavon: Tilisuna-Alpe 2300 m, Zeinisjoch 2000 m (Breidl.).

L Grenzkamm: auf dem Rauheck gegen den Kanz auf Hornsteinschiefer 2340—2400 m (Mdo. 6 p. 163; 8 p. 216).

O Paznaun: an Steinwällen bei Galtür 1600 m (Breidl.), Jamtal 16—2200 m (Stolz b. Mat. 6 p. 141), Fimbartal 17—2400 m, fruchtend (Breidl., Stolz l. c.); Kaunertal: Krümmgampental, Oelgrubenjoch 3000 m; Oetztal: Birkkogel bei Kühetai 2650 m (Stolz l. c.), Gaisbergtal bei Gurgl 19—2200 m (Breidl.).

I Sellrain: Neunerkogel im Kraspestal 2600 m, Schönlisens 2400 m; Innsbruck: Saile 2400 m, fruchtend (Stolz b. Mat. 6 p. 141), Patscherkofel (Kern.), Sonnenspitze am Glungezer 2640 m (Stolz l. c.); Volderthal: auf Schiefer bei der Stiftsalpe 1300 m (Handel b. Mat. 4 p. 44); Stubai: Oberbergtal, fruchtend (Stolz b. Mat. 6 p. 141); Gschnitztal: Pinnisserschrofen, Alfachalpe (Baer *ibid.*), Gschnitz 1300 m; Steinach 1100 m, auf Schiefer (F. Saut. 1 p. 199, Hb.).

U Zillertal: in der Zemm und Floite (Jur. 9 p. 19), im obersten Sondergrund (Ltz. 2 p. 1331).

K Windau: Filzkopf (Mdo. b. Limpr. 7 II. p. 794); Geisstein: an Felsen bei 23—2360 m (Saut. b. Limpr. 7 II. p. 794; Mdo. 7 p. 230; Breidl.).

M Mathaunkopf bei Graun 22—2800 m (Breidl.); Mittereck bei St. Valentin 2900 m (Breidl. 3 p. 173); auf granitischen Felsblöcken um das Gasthaus von Trafoi 1600 m mit der Art, fruchtend (Milde 30 p. 3, 8), humose Schieferfelsspalten bei den letzten Zirben ober der Franzeshöhe (Kern. Hb.); Suld (Holl. in Hb. F.): an beschatteten Granitblöcken bei St. Gertraud (Geheeb Hb. F.), am Anstiege gegen die Schöntaufspitze 2500 m (Breidl.), Schaubachhütte (Röll 1 p. 664); Kirchbergtal in Ulten, fruchtend 18—2600 m (Stolz b. Mat. 6 p. 141).

E Brenner: Hühnerspiel 1900 m (F. Saut. 1 p. 199, Hb.).

P Taufers: auf der Höhe des Hörndlpasses 2600 m, Pfaffenlücke, Nordseite, in Massenvegetation bis 2080 m herab, nicht selten (Ltz. 2 p. 1330, 1327; Mdo. 3 p. 399 als *L. saxatilis*); Buchenstein: am Pordoijoch über Arabba 1720—1790 m, Trümmer von Eruptivbreccien ganz überziehend, im Kar am Col di Lana, Ornellatal, auf Trümmern der eruptiven Breccien zwischen den letzten Häusern und der unteren Alpe 1720—1880 m, fruchtend, Trümmerfelder am Padon 2240—2400 m (Mdo. 5 p. 195, 79, 198, an letzteren beiden Stellen als *L. saxatilis*, 199, 201; 4 Nr. 63); nach Limpr. 7 II. p. 794 bis 2500 m.

D Innervillgraten, fruchtend (Gand. Mscr. u. b. Limpr. 7 II p. 794); Tauern: besonders charakteristische, nie fehlende Massenvegetation der nivalen Region bis zu den Grenzen aller Vegetation, geht bis in die untere alpine Region herab (Ltz. & Mdo. 1 p. 105), Dorferalpe und Rainerkees am Venediger 22—2500 m, Möserlingwand, Froßnitztal und Katalberg 20—2400 m (Breidl.), Froßnitztal ♂ (Breidl. b. Limpr. 7 II. p. 794), am Venediger und um Windischmatrei mehrfach, Zunig bis 2700 m (Stolz b. Mat. 6 p. 141), auf Alpen in Kals, fruchtend, beim See in der Dorferalpe; um Innichen; Sillian; Lienz (Gand. Mscr. u. b. Limpr. 7 II. p. 794).