Lienz an Laub- und Nadelbäumen sowie an alten Planken (Gand.), Galitzenklamm, an morschem Holze (F. Saut. Hb.).

B Gröden: Schindeldächer beim Brauhaus in Pontifes (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 18); Bozen: Runkelstein an Bäumen (F. Saut. Hb.).

Var. γ **rupestris** Milde. — Limpr. III. p. 7.

M Meran: auf Felsen im Vellauertale zwischen Braunia und Hedwigia mit reifen Kapseln, 15. Dezember 1863 (Milde 23 p. 89; 30 p. 8; b. Limpr. 7 III. p. 8).

127. **Pylaisia** Bruch et Schimp.

1. (555.) **P. polyantha** (Schreb.) Br. eur., Hypnum polyanthos Schreb., Leskia polyantha Timm, Hedw. — Limpr. III. p. 10 Nr. 704.

In den Tälern und in der Bergregion allgemein verbreitet (Breidl.).

V Bregenz: häufig (Breidl.; Blumr. b. Mat. 1 p. 245; 3 p. 86; 4 p. 45); Feldkirch, gegen Frastanz (Rompel b. Mat. 1 p. 245).

O Zwischen Pians und Landeck; Obsteig; Oetztal: Maurach bei Umhausen, auf Gestein (Stolz b. Mat. 3 p. 147).

I Seefeld (F. Saut. Hb.); um Innsbruck und Hall gemein, beiderseits des Tales bis 1100 m an den verschiedensten Holzpflanzen, vorwiegend Laubhölzer, namentlich Erlen, auch auf Gestein (Pkt. b. DT. 10 p. 249, Hb. F.; Kern. Hb.; Leithe 2 p. 128; Benz, Sarnth. Hb. F.; Wagner, Murr, Benz, Baer, Stolz b. Mat. 1 p. 245; 3 p. 86; 6 p. 146, 147); Schönberg, auf Sambucus (Kern. Hb.); Gschnitz, auf morschem Holze 1240 m; Steinach, an morschen Aesten, Planken, Wurzeln, an Eschen, an Hohlwegen (F. Saut. 1 p. 200, Hb.).

U Kasberg bei Jenbach, an Fichten und Weiden (Kern. 86); Rattenberg, an Sambucus nigra (Sarnth. b. Mat. 5 p. 105); Kufstein, Zillertal, überall gemein (Jur. 9 p. 19).

K Kitzbühel: auf Sandboden nächst dem Buchwalde bei Aurach (Ung. 8 p. 269), Kitzbühel (Nießl b. Mat. 3 p. 86).

M Meran, gemein (Bamb.): auf Weiden neben den Wasserleitungen (Milde 13 p. 435).

P Bruneck: Granitgeschiebe gegen die Rienz (Reyer); Ampezzo: auf Flußgries bei Höhlenstein (Mdo. 3 p. 418); Buchenstein: bei Pieve auf zusammengehäuften Gesteinstrümmern 14—1430 m, zwischen Salesei und der Talsohle auf allen Gesteinen (Mdo. 5 p. 99, 101).

D Tauern: in den tieferen Tälern auf Schiefer und Holz bis 1170 m (Mdo. b. Ltz. & Mdo. 1 p. 105); Innervillgraten, Innichen, Lienz, an Bäumen, Zäunen, alten Brettern, selten an Mauern (Gand.; F. Saut. Hb.), Nikolsdorf (Simmer).

N Rabbital, an Feldbäumen (Vent. 2 p. 161).

B Sehr selten auf der Seiseralpe mit Heterocladium dimorphum (Milde 29 p. 17); Bozen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 446; Sendtn. Hb. F.): auf Rinden (Krav. 1 p. 20), zwischen Bozen und Sigmundskron (Sendtn.), Runkelstein (F. Saut. Hb.), Wald bei der Aue im Eisaktale (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 18). Quirein (Pfaff b. Mat. 5 p. 105), Haslach, an Eichen und Weiden (Hsm. Hb.); Ueberetsch: Bergschlucht zwischen Boimont und Hocheppan; Mendel (Sendtn.).

T Um Trient (Vent. 22 p. 90), hier bei Povo schon von Perini, ca.