

(Reyer); Steinach, an Ufermauern, Felsen, Zäunen, auf Waldboden (F. Saut. 1 p. 200, Hb.); Schmirn, auf Schiefer (F. Saut. Hb.).

U Gipfelplatte des vorderen Sonnwendjoches 2220 m auf karg begrastem Boden (Arn. 4 XII. p. 531); an Gartenmauern, Felsblöcken u. s. w. in den Umgebungen von Kufstein und bei Mariastein gemein, nur steril; Zillertal: bei Mayrhofen gemein, ebenso (Jur. 9 p. 19).

K Kitzbühler Horn 1960 m; Kleiner Rettenstein 2200 m; Rescheskogel 20—2200 m (Breidl.).

M Meran (Bamb. 4 p. 664; b. Saut. 29 p. 63; b. Schimp. 3 p. 107, Hb. F.): sehr häufig an Grasplätzen und auf Dorfmauern und Wassermauern, stets steril (Milde 13 p. 452). Wegränder bei Algund (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 18), Passerbachschutzmauer (Reyer), auf feuchten Felsen im Naiftale, spärlich fruchtend (Bamb. Hb. F. und in Hb. F. Saut.).

E Gemein in Innerpferssch (Mat. 3 p. 86).

P Enneberg: zwischen Picolein und Abtei auf Muschelkalk (K. Müll. 3 p. 280); Ampezzo: Eingang des Höhlensteinertales an Mauern, Schutt und Felsen allgemein, im Gemäuer von Peutelstein (Mdo. 3 p. 418, 420); Buchenstein: grasiges und trockenes Terrain am Monte Ornella über 2270 m, östlich von der Mühle bei Pieve auf den zwischen Culturen zusammengehäuften, teilweise beschatteten Steinrümern 14—1430 m, zwischen Corte und Andraz, auf den Felsen neben der Ruine Andraz (Mdo. 5 p. 200, 99, 100, 77).

D In Innervillgraten an sonnigen Abhängen und auf Mauern (Gand. Mscr., b. Kern. 78^a Nr. 2710, 78^b VII. p. 85); Tauern: Matreier Tauernthal 12—1400 m, Steinerlpe 2000 m (Breidl.), ziemlich häufig im Gebiete der Kalkschiefer, am Ganimiz und in der Teischnitz bis 2600 m, im Gneißgebiete sehr spärlich (Ltz. & Mdo. 1 p. 105), Kals, vor dem Zusammenflusse des Berger- und Peischlertales, seltsame Formen: humile, vix pinnatum, ramulis fere divaricatis (Mdo. 7 p. 363); Lienz: auf Kalkboden verbreitet, nur steril (F. Saut. Hb.).

B Gröden: an Wegrändern bei Pontifes (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 18); Ratzes: an einer einzigen Stelle auf faulem Holze im Walde beim Badehause (Milde 29 p. 17); Bozen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 442); Runkelstein, fruchtend (F. Saut. Hb.), an Porphyrfelsen des Calvarienberges (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 18), Virgl, unterhalb des Koflerhofes (Zickendr. b. Mat. 5 p. 105); Eppan; Mazon bei Neumarkt (Krav. 1 p. 19).

F Fassa: im Schutt der Pordoidolomite, Pordoijsch, an der vom Südosteck des Pecchè abgetrümmernten Schutthalde 2370—2470 m, bis auf die trockensten Stellen gehend (Mdo. 5 p. 562, 196; b. De Not. 5 p. 213).

T An der Poststraße bei Baselga di Vezzano, mit einzelnen Früchten (Vent. 7 p. 60; 22 p. 91; Vent. et Boll. 1 p. 20).

R Am Ledro-See (Röll 1 p. 664).

130. Climacium Web. et Mohr.

1. (563.) **C. dendroides** (L.) Web. et Mohr, Hypnum dendroides L. — Limpr. III. p. 34 Nr. 713.

V Bregenz: auf Wiesen bei Mehrerau (Blumr. b. Mat. 1 p. 245); Feldkirch: Tosters (Schönach; Mat. 1 p. 245).