

24. (593.) *B. erythrorrhizon* Br. eur., *Hypnum erythrorrhizon* Hartm. — Limpr. III. p. 126 Nr. 747.

**D** Von Unger im Jahre 1859 auf der Südseite des Venediger gesammelt mit *Webera Ludwigii*, *Polytrichum sexangulare* etc., steril (Jur. 16 p. 164).

25. (594.) *B. rivulare* Br. eur., *Hypnum rivulare* Bruch b. Wils. — Limpr. III. p. 128 Nr. 748.

Von den Tälern bis in die untere Alpenregion gemein (Breidl.).

**V** Bregenz: Gebhardsberg, Rappenloch, fruchtend, Acherer bei Kennelbach, steril, Fuchstobel, fruchtend, in den verschiedensten Formen am Talbachwege nach Fluh, unterer Schmidobel, an der Seemauer bei der Stadt, auch hinwieder fruchtend, Fluh (Blumr. b. Mat. 1 p. 247; 2 p. 196; 4 p. 47; 5 p. 106); Feldkirch: Kapf, fruchtend (Mat. 1 p. 247); Bludenz, gegen Brand 900—1200 m; Montavon: Gampadelstal 1900 m (Breidl.).

**I** Sellrain: Quelle des Krimpenbaches am Roßkogel, Praxmar, in einem Quellenrinnsal 14—1600 m (Kern. Hb.), Praxmar, Lisens, Kemater Wasserfall, fruchtend (Stolz b. Mat. 6 p. 155); Innsbruck: Plätschental, in der Kranebitter Klamm auf feuchtem Boden unter Gebüsch, Wasserleitungsröhren am Höttinger Berg (Kern. Hb.), häufig und nicht selten fruchtend südlich von Innsbruck und Hall an feuchtem Gestein und Holzwerk, an Quellen und Wasserrinnsalen (Kern. Hb. u. 86; Murr, Handel, Stolz b. Mat. 1 p. 247; 4 p. 47; 6 p. 155), vom Innufer bei Ampaß bis in die alpine Region des Glungezer (Kern. Hb.); Gschnitz: an Bachsteinen, steril (F. Saut. 1 p. 200); Steinacherberg 1400 m, an sumpfigen Stellen (F. Saut. Hb.); hieher gehört auch die Angabe von *Rhynchostegium megapolitanum*: Steinach, an Gräben 1100 m (F. Saut. 1 p. 201).

**U** Achental: Quelle unter der Schranbachalpe im Aotal (Kern. Hb.); um Kufstein ziemlich allgemein verbreitet, selbst an schattigen Stellen der Festungsmauern (Hfl. 39 p. 192; Jur. 9 p. 20); Zillertal: Gerlos, 1040 m an Quellen mit Kalk- und Kieselboden (Mdo. 2 p. 382; Ltz. 2 p. 1316).

**K** Kitzbühel: Jochbergwald 1200 m (Breidl.).

**M** Soyjoch im Martelltale; Meran: Zieltal (Stolz b. Mat. 6 p. 155), Finelöcher (Bamb.), an der Etsch, an nassen Stellen am Fuße des Marlingerberges, steril ♀ (Milde 13 p. 452).

**E** Brixen: Steine am Riolbache, fruchtend (Sarnth. Hb. F.).

**P** Ampezzo: Cristallotal 1720 m, fremdartig, 5 Zoll hoch, quellenreiche Talfläche von Costeana mit den Cratoneuren 1850—1920 m (Mdo. 3 p. 439, 598; 4 Nr. 70), Ampezzaner Alpen bis 2200 m (Mdo. 8 p. 246).

**D** Gemein (Gand.); Tauern: sehr zerstreut, prachtvoll in den Matreier Auen bis Huben hinab 940 m, im Gschlöß 1750 m, in Schluchten oberhalb des Tauernhauses prachtvoll bis ca. 1950 m (Ltz. & Mdo. 1 p. 107), Windischmatrei 2130 m (Ltz. b. Limpr. 7 III. p. 130), Gschlöß, Mullwitzkees 2400 m, Mäserlingwand, Matreier Tauertal, Zunig (Stolz b. Mat. 6 p. 155); Innichen (Hsm.), Fischeleintal in Sexten (F. Saut. Hb.); Lienz: an Bachsteinen des Kalkgebietes (Pokorny b. Hfl. 37 p. 408; F. Saut. Hb.).

**N** Pejo: bei der Sauerquelle (Vent. 22 p. 95); Rabbi: steril in einer Quelle unweit der „malga delle capelle“, breite Rasenüberzüge auf