

22 p. 99); Nonsberg: nahe dem Gampenjoel e, fruchtend (Pfaff b. Mat. 5 p. 107).

B Ritten: Bacherlewald (Hsm. Hb.); Bozen: bei Seit und im Eggentale (Pfaff b. Mat. 5 p. 107); bei Aldein (F. Saut. Hb.).

F Fleims: Cavelonte (Vent. 22 p. 99); Primör: Val Calda, auf faulem Holze 1465 m (Degen b. Mat. 4 p. 49).

G Adamello: Monte Pissana (Rota b. De Not. 5 p. 190).

T Val delle Seghe bei Molveno; Bosco la Mar bei Terlago (Vent. 22 p. 99).

R Folgaria (Tecilla b. Hfl. 51); Monte Baldo (Vent. 22 p. 99).

141. *Amblystegium* Br. eur.

1. (636.) **A. Sprucei** (Bruch) Br. eur., *Leskea Sprucei* Bruch, *Hypnum Sprucei* Spruce, *Brachythecium Sprucei* Sacc. et Bizz. in *Atti istit. ven.* 6. ser. I. (1883) p. 1313. — *Limpr.* III. p. 296 Nr. 807.

V Kleines Walsertal: Klüfte des Schrätkalkes unter der Madertal-Alpe bei Riezlern 1500 m (Holl. 2 p. 81); Bludenz (Reyer).

L Grenzkamm: Mädelegabel beim Gletscher 2340 m (Holl. b. Mdo. 6 p. 174).

O Landeck (Holl. in Hb. F. Saut.); Wald im Norden von Obladis, Glimmerschiefer 1330 m (Reyer); Obsteig, fruchtend (Stolz b. Mat. 6 p. 161).

I Innsbruck: Mühlbach bei Mutters, unter Dolomittfelsen (Stolz b. Mat. 6 p. 161); Waldrast: auf lockerer Erde der kleinen Höhlen in den Kalkwänden links oberhalb der Matreier-Grube (Arn. 4 XIV. p. 477).

P Ampezzo: Peutelsteinklamm, in den felsigen Wäldern von der Federa bis gegen die Giau-Alpe 1690 m (Mdo. 3 p. 420, 595); Buchenstein: Schutthalde am Pecchè nächst dem Pordoijsch unter und zwischen überhängenden Felsen 2370—2470 m, zwischen Blöcken um die Davedinomündung, ca. 1390 m, steril (Mdo. 5 p. 196, 194).

D Steril in der Umgebung von Windischmatrei, noch im Steiner-Alpentale am Ganimiz neben *Desmatodon obliquus* und *Timmien* 2010—2080 m (Ltz. & Mdo. 1 p. 111), Musing und Steiner-alpe (Stolz b. Mat. 6 p. 161); auf nassem Tuff unter dem Wildbad Innichen, Sexten, in Dolomithöhlen im Fischeleintale (Gand.), an Rinnen des kalkhaltigen Wassers beim Bade Abfalterbach (F. Saut. Hb.); in der Umgebung von Lienz (Ltz. & Mdo. 1 p. 111).

F Fassa: Durontal, am Nordosthang vom Monte delle Donne auf Humus in verwachsenen Kalkklüften 1690—1750 m, Fedaja, in den dunkelsten Klüften bei 2150—2210 m (Mdo. 5 p. 567, 548; 4 Nr. 83), nach Mdo. b. *Limpr.* 7 III. p. 297 hier bis 2380 m, Val Contrin (Vent. 22 p. 99), Co'le Ombert (Vent. b. *Limpr.* I. c.).

T Paganella: in einer Höhle 80 m unter dem Gipfel [2050 m] (Vent. 8 p. 25; 16 p. 62; 22 p. 99; Vent. & Bott. 1 p. 13).

R Cima Posta bei Ala (Vent. 22 p. 99).

Im Allgemeinen zwischen 1270 und 2470 m (Ltz. & Mdo. 2 p. 457).

2. (637.) **A. confervoides** (Brid.) Br. eur., *Hypnum confervoides* Brid. — *Limpr.* III. p. 298 Nr. 808.

V Bludenz: bei Montigl auf Kalktrümmern 600—700 m (Breidl.).