

p. 697; b. Hfl. 37 p. 454; b. DT. 10 p. 252 u. 253, Hb. F.), Lisens, in der Nähe sumpfiger Quellen: γ *aduncoides* Hüb. l. c. (Pkt. 4 p. 53; ein Beleg ist jedoch nicht vorhanden), Votschertal, steril (Stolz b. Mat. 6 p. 170), in Wasserläufen im westlichen Aste des Senderstales 1800 m, fruchtend (Handel b. Mat. 4 p. 51); Innsbruck: im ruhig fließenden Wasser des Gießen (Kern. Hb.), im Sumpfe unter der Schrofenhütte (Hfl. 37 p. 452 u. b. DT. 10 p. 252 als H. Kneiffii, Hb. F.), in stehenden Wässern am Paschberg (Hfl. 37 p. 454), Tümpel bei Lans mit *Ranunculus Drouetii* (Kern. Hb.), im Graben beim Villersee (Pkt. 4 p. 53 als β *gracile*, siehe oben, aber sonst nirgends), in den Lachen des Lanser Moores, Waldsumpf bei Patsch, Patscherkofel, an diesen beiden Orten fruchtend, Loreto bei Hall (Stolz b. Mat. 6 p. 170); Gnadenwald: im Moor bei der Gunggl 870 m, fruchtend (Handel b. Mat. 4 p. 51); Stubai: Gleinsersee (F. Saut. Hb.; Kern.), in einem Sumpfe nächst der Waldrast (Leithe 2 p. 127); Gschnitztal: Gräben bei Laponas, Trins, steril (F. Saut. 1 p. 202), Rohrsee in Obernberg (Wettst. b. Kern. 78^a Nr. 2313, 78^b VI. p. 111), Obernberg, Steinacherjoch 2050 m (F. Saut. Hb.).

U Zillertal: Torfstümpfe am Gletscherrande des Schwarzenstein 2120 m (Wagner in bot. Mus. Wien).

K Windau: in Pfitzen unter der Rethelwandalpe (Mdo. 7 p. 217); Kitzbühel: Moorgrund am Schwarzsee (Kern.; Reyer; Nießl b. Mat. 3 p. 88).

P Ampezzo: Versumpfungen zwischen der Tofana und Crepa 14—1690 m (Mdo. 3 p. 596); Buchenstein: Quellsümpfe am Pordoihoch 21—2200 m, Quellmoore an der Nordostseite des Col di Lana 2150—2180 m (Mdo. 5 p. 195, 78).

D Innervillgraten: im obersten der Sieben Seen im Ainettale, ganz unter Wasser: δ *amphibium* h. *dolichoneuron* ** *striatum* Sanio; siehe Limpr. 7 III. p. 367 (Sanio 2 p. 147); Tauern: am Rande des Grünsee (Ltz. & Mdo. 1 p. 64), Prosegg bei Windischmatrei (F. Saut. Hb.), Pfitzen des Peischlerpasses 2560 m (Mdo. 7 p. 364); Innichen: an der unteren Au und in der Nähe des Drau-Ursprunges (Gand.); Lienz: in Sumpfgräben des kleinen Tristacher-Sees (F. Saut. Hb.).

N Monte Tonale (Rota b. De Not. 5 p. 143); Rabbital: in feuchten Wäldern (Vent. 7 p. 61; siehe var. *falcatum*).

B Quelle am Rittner Horn 2200 m, bei Klobenstein (Hsm. b. Hfl. 37 p. 454), in einem Torfmoore bei Kematen (Hsm. b. Hfl. 33 p. 318; 37 p. 454); Bozen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 512).

T Pinè: in feuchten Wäldern (Vent. 7 p. 61), in Sümpfen, steril, nur einmal (Vent. 19 p. 167; 22 p. 101).

R Rovereto (Crist. Hb. F.).

Var. β *submersum* Schimp. — Limpr. III. p. 427.

I Sumpfgräben zwischen Völs und Aßling (F. Saut. Hb.).

U Therme von Hinterdux und

E am Brenner (F. Saut. 1 p. 202).

N Rabbi, in Bächlein (Vent. 7 p. 61; siehe auch γ).

Var. γ *falcatum* Br. eur. — Limpr. III. p. 427.

O Oetzal: Bach bei Kühetai, Zwieselalpe (Stolz b. Mat. 6 p. 170).