

- N** Rabbi, auf feuchten Wiesen (Vent. 2 p. 160; 22 p. 102).  
**B** Um Ratzes an Wegen, an Bachrändern nicht selten (Milde 29 p. 9, 18), am Schlern bei 1300 m (Milde 39 p. 7); Bozen: an Brettern der Auwiese in Gries, beim Köhler Brunnl (Hsm. Hb. als *H. pratense*; b. Jur. 9 p. 12); siehe auch *H. pratense*.  
**F** Predazzo: Mulatto, Porphyris bis 2050 m hinauf (Mdo. 5 p. 579).  
**T** Trient; im Campo trentino (Vent. 22 p. 102).  
**R** Monte Baldo: Acque negre (Vent. b. Sacc. & Bizz. 1 p. 1323; Vent. 22 p. 102).

Var. *elatum* Schimp., *H. arcuatum*  $\beta$  *elatum* Schimp., *H. Lindbergii*  $\beta$  *elatum* Limpr. — Limpr. III. p. 501.

- L** An einem Graben zwischen Hohenschwangau und Reutte 1856, fruchtend (Schimp. 4 ed. 2 p. 759).  
**I** Gschnitztal 1300 m (Stolz b. Mat. 6 p. 177).  
**D** Innervillgraten: häufig an quelligen Orten und feuchten, grasigen Abhängen (Gand. Mscr. u. b. Limpr. 7 III. p. 501); Tauernbach bei Windischmatrei (Stolz b. Mat. 6 p. 177).

49. (700.) *H. pratense* Koch. — Limpr. III. p. 501 Nr. 879.

**I** Steinach, Steinacherberg, Obernberg 1050–1600 m auf Sumpfwiesen, steril (F. Saut. 1 p. 202, Hb.).

[**U** Die Angabe: Kufstein (Hfl. 39 p. 192) dürfte sich auf *H. Lindbergii* beziehen; siehe Jur. 9 p. 22.]

**M** Moorgrund am Reschensee 1475 m (Breidl. b. Limpr. 7 III. p. 503 u. in litt.).

**D** Lienz: auf sumpfigen Wiesen im Tale und der Gebirge, stets steril (F. Saut. Hb.).

**N** Rabbital, an feuchten Stellen (Vent. 7 p. 62; 22 p. 102).

**B** Bozen (Vent. 22 p. 102), die Angabe: Bozen an berieselten Waldstellen (Hsm. b. Bertol. 3 I. p. 524; Krav. 1 p. 19) bezieht sich nach Jur. 9 p. 12, 22 sicher auf *H. Lindbergii*.

50. (701.) *H. Haldanianum* Grev., *H. cylindricum* Bruch. — Limpr. III. p. 504 Nr. 880.

**V** Großes Walsertal: auf einem mit Lehm verunreinigten Baumstamme mit *H. reptile* neben dem Bache an Wege hinter Buchboden 975 m, höchst üppig und reich mit Kapseln besetzt, August 1848 (Arn. b. K. Müll. 2 p. 416; b. Hfl. 37 p. 469; in Hb. F. Saut.).

**I** Steinach, auf faulem Holze bei 1600 m (F. Saut. 1 p. 202, Hb.).

**M** Meran: steril und sparsam auf altem Holze an den felsigen, schattigen Abhängen bei Trauttmansdorff (Milde 13 p. 438, 453).

51. (702.) *H. nemorosum* Koch. — Limpr. III. p. 507 Nr. 881.

**V** Vorarlberg (Reyer b. Limpr. 7 III. p. 509).

**I** Innsbruck: Villerweg auf einem großen Schieferblocke über Humus (Kern. Hb.).

**F** Alba in Fassa (Vent. 22 p. 103).

52. (703.) *H. Lorentzianum* Mdo. — Limpr. III. p. 509 Nr. 882.

**K** Windau: Schlucht vor Rettenbach 780 m, spärlich unter *Sphagnum squarrosum* (Mdo. 7 p. 196).